



ពូជស្រូវសំខាន់ៗសម្រាប់ផលិតកម្មស្រូវ និងនាំអង្ករចេញ

ដើម្បីសម្រេចនូវគោលនយោបាយស្តីពីការជំរុញផលិតកម្មស្រូវ និងការនាំអង្ករចេញរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានដាក់ចេញឲ្យប្រើប្រាស់ពូជស្រូវដែលមានទិន្នផល និងគុណភាពអង្ករខ្ពស់ចំនួន១០ ពូជដែលក្នុងនោះមាន៖

- ១. ពូជស្រូវស្រាលមិនប្រកាន់រដូវចំនួន៣ពូជគឺពូជសែនពិដោរ ពូជអ៊ីអិរ៦៦ ពូជផលសារ។
- ២. ពូជស្រូវកណ្តាលប្រកាន់រដូវចំនួន៤ពូជគឺ ពូជផ្ការដួល ពូជផ្ការដេង ពូជផ្ការមៀត និងពូជផ្កាច័ន្ទសែនស។
- ៣. ពូជស្រូវធ្ងន់ប្រកាន់រដូវមានចំនួន៣ពូជគឺ ពូជរាំងជ័យ ពូជខា៤ និងពូជខា៦។

១. ពូជស្រូវស្រាលមិនប្រកាន់រដូវ

១.១. លក្ខណៈពិសេសរបស់ពូជស្រូវ

ក. ពូជស្រូវសែនពិដោរ

ពូជសែនពិដោរ ជាប្រភេទពូជស្រូវស្រាល និងជាពូជស្រូវក្រអូប ដែលបានបញ្ចេញ និងផ្សព្វផ្សាយឲ្យកសិករប្រើប្រាស់ដោយក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទនៅដើមឆ្នាំ២០០២ ហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះពូជស្រូវសែនពិដោរ កំពុងប្រើប្រាស់ក្នុងផលិតកម្មស្រូវរដូវប្រាំងនិងស្រូវស្រាល ដើមរដូវដោយកសិករ នៅទូទាំងប្រទេស ។ ពូជនេះមានទិន្នផលខ្ពស់មាន ក្លិនក្រអូប មានគុណភាពអង្ករល្អមានភាពក្លឹក្លាវែងរលូន និងបាយទន់ឆ្ងាញ់ ពិសារ ជាពិសេសជាពូជមានប្រភេទអង្ករ មានតម្លៃខ្ពស់នៅក្នុងទីផ្សារជាតិ និងទីផ្សារអន្តរជាតិ។



ពូជសែនពិដោរ ជាប្រភេទពូជស្រូវមិនប្រកាន់រដូវ ដែលអាចដាំដុះ បាននៅគ្រប់រដូវកាល ជាពិសេស ស្រូវដើមរដូវ នៅរដូវវស្សា ស្រូវប្រដេញ ទឹក និងស្រូវរដូវប្រាំង។ ពូជនេះមានអាយុកាលចាប់ពីថ្ងៃសាប រហូតដល់ពេលច្រូតកាត់ ពី ១១០ ថ្ងៃ - ១២០ ថ្ងៃមានកម្ពស់ ដើមពី៩៥ស.ម - ១១០ ស.ម ចំនួនដើមបែកផ្តល់ផលពី ៥ - ២០ដើមក្នុង១គុម្ព ប្រវែងកូរមានពី ២០ ទៅ ៣០ ស.ម និង ចំនួនគ្រាប់ក្នុង១កូរមានពី ១១០ - ១៧០គ្រាប់។ ពូជសែនពិដោរ ជាប្រភេទពូជមិនធន់នឹងមហាជំងឺគ្រុន ហើយមានទិន្នផល ពី ៣,៥តោន - ៥,៥តោនក្នុង១ហិកតាហើយបើក្នុងលក្ខខណ្ឌអំណោយផលល្អអាចផ្តល់ទិន្នផលរហូតដល់៨ទៅ១០តោន ក្នុង១ហិកតា។

ខ. ពូជស្រូវអ៊ីអិរ៦៦

ពូជស្រូវអ៊ីអិរ៦៦ ជាប្រភេទពូជស្រូវស្រាល ដែលបានបញ្ចេញ និងផ្សព្វផ្សាយឲ្យកសិករ ប្រើប្រាស់ដោយក្រសួង

កសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទនៅដើមឆ្នាំ១៩៩០ ហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ពូជស្រូវអ៊ីអិរ៦៦ កំពុងប្រើប្រាស់ ក្នុង ផលិតកម្មស្រូវរដូវប្រាំង និង ស្រូវស្រាលដើមរដូវ ដោយកសិករ នៅទូទាំងប្រទេស។ ពូជនេះមានទិន្នផលខ្ពស់ មានគុណ ភាពអង្ករល្អមានភាពភ្លឺថ្លាវែងរលូន និងជាពូជមានប្រភេទ អង្ករអាចលក់បាននៅក្នុងទីផ្សារជាតិ និងទីផ្សារអន្តរជាតិ។

ពូជស្រូវអ៊ីអិរ៦៦ ជាប្រភេទពូជស្រូវមិនប្រកាន់រដូវ ដែលអាចដាំដុះបាននៅគ្រប់រដូវកាល ជាពិសេសស្រូវដើមរដូវ នៅរដូវវស្សា ស្រូវប្រដេញទឹក និងស្រូវរដូវប្រាំង។ ពូជនេះមានអាយុកាលចាប់ពីថ្ងៃសាប រហូតដល់ ពេលច្រូតកាត់ ពី ១០៥ ថ្ងៃ - ១១៥ ថ្ងៃ មានកម្ពស់ ដើមពី ៨០ស.ម - ១១៨ស.ម ចំនួនដើមបែកផ្តល់ ផលពី ១២ - ១៨ ដើមក្នុង ១ គុម្ព ប្រវែងកូរមានពី ២៥ ទៅ ២៦ ស.ម និងចំនួនគ្រាប់ក្នុង១កូរមានពី ១០០ - ១២០គ្រាប់។ ពូជស្រូវអ៊ីអិរ ៦៦ ជាប្រភេទ ពូជមិនធន់នឹងមមាធាតុ ហើយមានទិន្នផលពី ៤.៥ តោន - ៦.៥ តោនក្នុង១ហិកតា ហើយបើក្នុង លក្ខខណ្ឌអំណោយផលល្អ និងការដាំដុះអនុវត្ត តាមប្រព័ន្ធប្រពលវប្បកម្មដំណាំស្រូវ វាអាចផ្តល់ ទិន្នផលរហូតដល់៨ទៅ១០តោនក្នុង១ហិកតា។



គ. ពូជស្រូវផលសារ

ពូជស្រូវផលសារ ជាប្រភេទពូជស្រូវស្រាល ដែលបាន បញ្ចេញ និង ផ្សព្វផ្សាយឲ្យកសិករប្រើប្រាស់ ដោយក្រសួង កសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទនៅដើមឆ្នាំ១៩៩៩ ហើយមក ដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ពូជស្រូវផលសារ បានកំពុងប្រើប្រាស់ក្នុង ផលិតកម្មស្រូវរដូវប្រាំង និងស្រូវស្រាលដើមរដូវ ដោយកសិករ នៅទូទាំងប្រទេស។ ពូជនេះមានទិន្នផលខ្ពស់ មានគុណភាព អង្ករល្អមានភាពភ្លឺថ្លាវែងរលូន និងជាពូជមានបាយទន់ឆ្ងាញ់។

ពូជស្រូវផលសារ ជាប្រភេទពូជស្រូវមិនប្រកាន់រដូវ ដែលអាចដាំដុះបាននៅគ្រប់រដូវកាលជាពិសេស ស្រូវដើមរដូវ នៅរដូវវស្សា ស្រូវប្រដេញទឹក និងស្រូវរដូវប្រាំង។ ពូជនេះមាន អាយុកាលចាប់ពីថ្ងៃសាប រហូតដល់ពេលច្រូតកាត់ ពី ៩៥ ថ្ងៃ ទៅ១១៥ ថ្ងៃ មានកម្ពស់ដើមពី៧៥ស.ម ទៅ ៩៥ ស.ម ចំនួន ដើមបែកផ្តល់ផលពី១០ ទៅ១៤ដើមក្នុង១គុម្ព ប្រវែងកូរមានពី២០ ទៅ ២៧ស.ម និងចំនួនគ្រាប់ក្នុង១កូរមានពី១០០ ទៅ ១៥០គ្រាប់។ ពូជស្រូវផលសារ ជាប្រភេទពូជមិនធន់នឹងមមាធាតុ ហើយមានទិន្នផលពី ៤.០តោន ទៅ ៦.០តោនក្នុង១ហិកតា ហើយបើក្នុងលក្ខខណ្ឌអំណោយផលល្អ និងការដាំដុះអនុវត្ត តាមប្រព័ន្ធប្រពលវប្បកម្មដំណាំស្រូវ វាអាចផ្តល់ទិន្នផលរហូតដល់៧ទៅ៨តោន ក្នុង១ហិកតា។



១.២. បច្ចេកទេសដាំដុះ

ក. សម្រាប់ស្រូវសន្ទួង

សំណាប: ដើម្បីឲ្យសំណាប និងដើមស្រូវមានសុខភាពល្អ ត្រូវប្រើពូជស្រូវសុទ្ធ និងមាន គុណភាពល្អ ដោយប្រើពូជពី២០ ទៅ ៤០គីឡូក្រាមសម្រាប់ស្ទឹង១ហិកតា។ ថ្នាលសំណាបត្រូវនៅជិតប្រភពទឹកដោយរៀបចំដីថ្នាលសំណាបឲ្យបានស្មើល្អ

ដោយត្រូវ និងរាល់ឱ្យបានច្រើនដង និងកៀរដីថ្នាលរួចប្រើ ដីកំប៉ុស្តតិច២ ទៅ ៣រទេះគោលើផ្ទៃដីសំណាប។ សាបគ្រាប់ស្រូវ ១គីឡូក្រាម លើផ្ទៃដីថ្នាល១០ម៉ែត្រការ៉េ ដើម្បីឱ្យសំណាបដុះលូតលាស់ល្អ ។ សំណាបមានអាយុកាលពី១៥ ទៅ ២០ថ្ងៃ ត្រូវដកយកទៅសន្លុង ដោយដកក្តាមស្លុងក្តាមនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយ។

សន្លងៈ

សំណាបមានអាយុកាលពី១៥ ទៅ ២០ត្រូវដកយកទៅស្លុងដោយ ដកក្តាមស្លុងក្តាម នៅក្នុងថ្ងៃតែ មួយ ។ ស្រែសន្លុងត្រូវត្រូវឱ្យបាន ២ ទៅ៣ដងនិងរាល់កៀរដីឱ្យបាន រាបស្មើល្អ និងលើកភ្លីស្រែបាន ខ្ពស់និងជាប់ល្អ និងប្រើដីកំប៉ុស្ត ឬ ដីលាមកគោលរយពុកល្អចំនួន ៥ គោន ឬ ២០រទេះគោ និងអាច



ប្រើដីដេ អា ប៉េ ចំនួន៥០គ.ក្រ ទៅ ១០០គ.ក្រ ទ្រាប់បាត តាមប្រភេទដី ។ ស្លុង ១ ដើម ទៅ ៣ ដើមក្នុង១គុម្ពជាជួរ ឬមុំ ចង្រានដោយស្លុងចំនួន ២០ គុម្ព ទៅ ២៥គុម្ពក្នុង១ម៉ែត្រការ៉េ។ បើដីមិនសូវមានជីជាតិអាចប្រើដីអ៊ុយរ៉េបំប៉នពី៥០ - ១០០ គ.ក្រក្នុង១ហិកតា នៅពេលស្រូវម្លើម ឬពេលស្រូវរកើតកូរ។ នៅពេលស្លុងរួចរយៈពេល៥-៧ថ្ងៃ ត្រូវស្លុងជូសគុម្ពណា ដែលបាត់ ចុះមើលស្រែជាប្រចាំនិងបោចស្មៅគ្រប់គ្រងថែទាំទឹកក្នុងស្រែ និងត្រួតពិនិត្យសត្វល្អិត ជំងឺសត្វមានប្រយោជន៍ នៅក្នុងស្រែជាប្រចាំ។

១.សម្រាប់ស្រូវពង្រៃ៖

ការរៀបចំដីស្រែពង្រៃ៖ និងព្រោះគ្រាប់ស្រូវ៖ ត្រូវត្រូវដីឱ្យបានច្រើនដងពី២ ទៅ ៣ ដង ហើយរាល់កៀរដីឱ្យរាប ស្មើល្អ និងប្រើដីកំប៉ុស្ត ឬ ដីលាមកគោដែលរយពុកល្អចំនួន៣-៥ គោន ឬ១៥ ទៅ ២០រទេះគោតាមលទ្ធភាពរកបាន។



ព្រោះគ្រាប់ស្រូវពី៧០-១០០ គីឡូក្រាមក្នុង ១ហិកតាដោយប្រើឧបករណ៍ ព្រោះគ្រាប់ ជាជួរឬ ព្រោះដោយដៃមានចំនួនដើមស្រូវ ពី១០០-១៥០ដើមក្នុង១ម៉ែត្រការ៉េ ឬ ចំនួន ដើមផ្តល់ផល ឬ កូរ ពី៥០០ ទៅ ៦០០ដើម ក្នុង១ម៉ែត្រការ៉េ (IRRI.;2009) ។

ការប្រើប្រាស់ដី និងការថែទាំ៖

បើដីស្រែមិនសូវមានជីជាតិអាចប្រើដីបន្ថែម ដោយប្រើដីដេ អា ប៉េ ចំនួន ៥០-១០០

គីឡូក្រាម ដីប៉ូតាស្យូម២៥គីឡូក្រាមក្នុង១ហិកតានៅពេលក្រោយព្រោះ១៥ ទៅ ២០ថ្ងៃ និងប្រើដីបំប៉ន ដីអ៊ុយរ៉េចំនួនពី៥០ គីឡូក្រាម និងដីប៉ូតាស្យូមចំនួន២៥គីឡូក្រាមក្នុង១ហិកតានៅពេលស្រូវម្លើម ឬរកើតកូរ។

ក្រោយពេលព្រោះរួចរយៈពេល១៥ ទៅ ២០ថ្ងៃ ត្រូវស្លុងជូសដើមណាដែលបាត់ ហើយចុះមើលស្រែជាប្រចាំ និងបោចស្មៅ គ្រប់គ្រងថែទាំទឹកក្នុងស្រែ និងត្រួតពិនិត្យសត្វល្អិត ជំងឺ និងសត្វមានប្រយោជន៍នៅក្នុងស្រែជាប្រចាំ។

១.៣. ការប្រមូលផលនិងទុកដាក់គ្រាប់ស្រូវ៖

ការប្រមូលផលនិងទុកដាក់គ្រាប់ស្រូវ៖

ត្រូវច្រូតកាត់នៅក្រោយពេលស្រូវចេញផ្កាស្រុះ រយៈពេល ៣០-៣៥ថ្ងៃ ឬ ពេលដែលគ្រាប់ស្រូវទុំប្រមាណ៨៥ភាគរយ ពេល គ្រាប់ស្រូវមានសភាពរឹង តែមិនស្រួយបាក់នៅពេលយកមកខាំ និង គ្រាប់ស្រូវមានអត្រាសំណើម២០- ២២ភាគរយ។ ត្រូវបោកបែនភ្លាម ក្រោយពីច្រូតកាត់ និងហាលគ្រាប់ស្រូវ២-៣ថ្ងៃ ឲ្យសំណើមគ្រាប់ មាន ១៤ភាគរយ ឬ គ្រាប់ស្រូវស្ងួតមានសភាពរឹងតែមិនស្រួយ បាក់ពេលខាំ។ ដើម្បីឲ្យគ្រាប់ស្រូវស្ងួតល្អ ត្រូវទុកដាក់គ្រាប់ស្រូវក្នុង បារក្រចៅ ឬ ជង្រុកដែលជាទឹកនៃឆ្នែងស្ងួត និងមានខ្យល់ចេញចូល បានល្អ និងការពារបាននូវការបំផ្លាញពីសត្វល្អិត(ខ្នុត) និងសត្វ កណ្តុរ ។ ត្រូវកត់ត្រាថ្ងៃ ខែពេលប្រមូលផលនៅលើបារ ស្រូវ ឬ ជង្រុកស្រូវ ។



២. ពូជស្រូវកណ្តាលប្រកាន់រដូវ

២.១. លក្ខណៈពិសេសរបស់ពូជស្រូវ

ក. ពូជស្រូវក្រអូបផ្ការដូវ

ពូជផ្ការដូវជាពូជស្រូវក្រអូប ដែលបានបញ្ចេញ និង ផ្សព្វផ្សាយឲ្យកសិករប្រើប្រាស់ ដោយក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខា ប្រមាញ់ និងនេសាទនៅឆ្នាំ១៩៩៩ ហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ពូជស្រូវផ្ការដូវ កំពុងពេញនិយមប្រើប្រាស់ក្នុងផលិត កម្មស្រូវវស្សា ដោយកសិករនៅទូទាំងប្រទេស។ ពូជនេះមានទិន្នផលខ្ពស់ មានគ្លីនក្រអូប មានគុណភាពអង្ករល្អមានភាពភ្លឺថ្លាវែងរលូន និងបាយទន់ ឆ្ងាញ់ពិសារ ជាពិសេសជាពូជមានប្រភេទអង្ករមានតម្លៃខ្ពស់នៅក្នុងទីផ្សារ ជាតិ និងទីផ្សារអន្តរជាតិ។

ពូជផ្ការដូវ ជាប្រភេទពូជស្រូវកណ្តាល ប្រកាន់រដូវមធ្យមចាប់ ចេញផ្កានៅពាក់កណ្តាលខែតុលា និងច្រូតកាត់ នៅពាក់កណ្តាលខែវិច្ឆិកា អាស្រ័យតាមអាកាសធាតុ និងពេលវេលាដាំដុះ។ ពូជនេះ មានកម្ពស់ដើម ពី ១១០ស.ម ទៅ១៧០ស.ម ចំនួនដើមបែកផ្តល់ផលពី ៥ ទៅ ១០ដើមក្នុង ១គុម្ភ។ បើក្នុងលក្ខខណ្ឌដីមានជីជាតិល្អ និងអនុវត្តដាំដុះតាមប្រព័ន្ធប្រពល វប្បកម្មដំណាំស្រូវ ចំនួនដើមបែក ផ្តល់ផលអាចមានទៅដល់ ១៤ ទៅ ១៨ ដើមក្នុង១គុម្ភ។ ប្រវែងកូរមានពី២០ ទៅ ៣០ស.ម និងចំនួនគ្រាប់ក្នុង ១កូរ មានពី១១០ ទៅ ១៥០គ្រាប់។ ពូជផ្ការដូវ ជាប្រភេទពូជធន់នឹងការលិច ទឹកជំនន់បានល្អតែវាមិនសូវធន់នឹងមហាជន្តោតទេ ហើយមានទិន្នផលពី ៣.៥តោន ទៅ ៥.៥តោនក្នុង១ហិកតា។

ខ. ពូជស្រូវក្រអូបផ្ការដេង

ពូជផ្ការដេងជាពូជស្រូវក្រអូប ដែលបានបញ្ចេញ និង ផ្សព្វផ្សាយឲ្យកសិករប្រើប្រាស់ ដោយក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខា ប្រមាញ់ និងនេសាទនៅឆ្នាំ២០០៦ ហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ពូជស្រូវផ្ការដេង កំពុងពេញនិយមប្រើប្រាស់ និងប្រជា កសិករធ្វើការដាំដុះនៅក្នុងផលិតកម្មស្រូវរដូវវស្សាទូទាំងប្រទេស ។ ពូជនេះមានទិន្នផលខ្ពស់មានគ្លីនក្រអូបមានគុណភាព អង្ករល្អ មានភាពភ្លឺថ្លាវែងរលូន និងបាយទន់ឆ្ងាញ់ពិសារ ជាពិសេសជាពូជមានប្រភេទអង្ករមានតម្លៃខ្ពស់នៅក្នុងទីផ្សារជាតិ និងទីផ្សារអន្តរជាតិ។

ពូជផ្ការដេង ជាប្រភេទពូជស្រូវកណ្តាលប្រកាន់រដូវមធ្យម ចាប់ចេញផ្កានៅពាក់កណ្តាលខែតុលា និងច្រូតកាត់នៅ ពាក់កណ្តាលខែវិច្ឆិកា អាស្រ័យតាមអាកាសធាតុ និងពេលវេលាដាំដុះ។ ពូជនេះមានកម្ពស់ដើមពី១០០ស.ម -១៧៥ ស.ម





វប្បកម្មដំណាំស្រូវ ចំនួនដើមបែក ផ្តល់ផលអាចមានទៅដល់២០-២៥ដើមក្នុង១គុម្ព ។ ប្រវែងកូរមានពី២០ ទៅ ៣០ស.ម និងចំនួនគ្រាប់ក្នុង១កូរមានពី១១០ - ១៥០គ្រាប់។ ពូជផ្ការំដេង ជាប្រភេទពូជធន់ទៅនឹងទឹកលិច ឬ ទឹកជំនន់ ប៉ុន្តែវាមិនសូវធន់នឹងមមាចត្នោតទេ ហើយមានទិន្នផលពី ៣.៥តោន ទៅ ៥.៨តោនក្នុង១ហិកតា។

គ. ពូជស្រូវក្រអូបផ្ការមៀត

ពូជផ្ការមៀតជាពូជស្រូវក្រអូប ដែលបានបញ្ចេញ និង ផ្សព្វផ្សាយឲ្យកសិករប្រើប្រាស់ ដោយក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ នៅឆ្នាំ២០០៦ ហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ពូជស្រូវផ្ការមៀត កំពុងពេញនិយមប្រើប្រាស់ក្នុងផលិតកម្មស្រូវវស្សាដោយកសិករនៅទូទាំងប្រទេស។ ពូជនេះមានទិន្នផលខ្ពស់ មានក្លិនក្រអូប មានគុណភាពអង្ករល្អ មានភាពភ្លឺថ្លាវែងរលូន និងបាយទន់ធ្លាញ់ពិសារ ជាពិសេសជាពូជមានប្រភេទអង្ករមានតម្លៃខ្ពស់នៅក្នុងទីផ្សារជាតិ និងទីផ្សារអន្តរជាតិ។

ពូជផ្ការមៀត ជាប្រភេទពូជស្រូវកណ្តាលប្រកាន់រដូវមធ្យម ចាប់ចេញផ្កាពីថ្ងៃ១៥ ទៅ ២៥ ខែតុលា និងច្រូតកាត់នៅពាក់កណ្តាលទៅចុងខែវិច្ឆិកា អាស្រ័យតាមអាកាសធាតុ និងពេលវេលាដាំដុះ។ ពូជនេះមានកម្ពស់ដើមពី ១០០ស.ម



ទៅ១៥០ស.ម ចំនួនដើមបែកផ្តល់ផលពី៨ -១៨ដើមក្នុង១គុម្ពបើក្នុងលក្ខខណ្ឌដីមានជីជាតិល្អ និងអនុវត្តដាំដុះតាមប្រព័ន្ធប្រពលវប្បកម្មដំណាំស្រូវ ចំនួនដើមបែក ផ្តល់ផលអាចមានទៅដល់២០-២៥ដើមក្នុង១គុម្ព ។ ប្រវែងកូរមានពី ២០ ទៅ ៣០ស.ម និងចំនួនគ្រាប់ក្នុង១កូរមានពី១១០ ទៅ ១៥០គ្រាប់។ ពូជផ្ការំដេងជាប្រភេទពូជធន់ទៅនឹងទឹកលិច ឬ ទឹកជំនន់ រយៈពេលមធ្យម ប៉ុន្តែវាមិនសូវធន់នឹងមមាចត្នោតទេ ហើយមានទិន្នផលពី ៣.៥ តោន ទៅ ៥.៨តោនក្នុង១ហិកតា។

ឃ. ពូជស្រូវកណ្តាលផ្កាចំនួនសែនសរ

ពូជផ្កាចំនួនសែនសរ ជាពូជស្រូវដែលបានបញ្ចេញ និង ផ្សព្វផ្សាយឲ្យកសិករប្រើប្រាស់ ដោយក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ នៅចុងឆ្នាំ២០០៩ ហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ពូជស្រូវផ្ការំដេង បានចាប់ផ្តើមនិងកំពុងពេញនិយមប្រើប្រាស់ ក្នុងផលិតកម្មស្រូវវស្សារបស់កសិករនៅ



កម្ពុជា។ ពូជនេះមានទិន្នផលខ្ពស់ មានគុណភាពអង្ករល្អ មានភាពឆ្លាវៃវែងរលូន និងបាយទន់ឆ្ងាញ់ពិសារជាពិសេស ជាពូជមានប្រភេទអង្ករមានតម្លៃ នៅក្នុងទីផ្សារជាតិ និង ទីផ្សារអន្តរជាតិ។

ពូជផ្កាចំនួនសែនសរ ជាប្រភេទពូជស្រូវកណ្តាល ប្រកាន់រដូវវស្សា ចាប់ចេញផ្កានៅចុងខែតុលាទៅដល់ដើម ខែវិច្ឆិកា និងច្រកកាត់នៅដើមខែធ្នូ អាស្រ័យតាមអាកាស ធាតុនិងពេលវេលាដាំដុះ។ ពូជនេះមានកម្ពស់ដើមពី ១៥០ ស.ម - ១៦០ស.ម ចំនួនដើមបែកផ្តល់ផលពី ៧ ទៅ ១០ ដើមក្នុង១គុម្ភ។ បើក្នុងលក្ខខណ្ឌដីមានជីជាតិល្អ និងអនុវត្ត ដាំដុះតាមប្រព័ន្ធប្រពលរប្បកម្មដំណាំស្រូវ ចំនួនដើមបែក ផ្តល់ផលអាចមានទៅដល់១៥ ទៅ ២០ ដើមក្នុង១គុម្ភ។ ប្រវែងកូរមានពី២០ ទៅ ៣០ ស.ម និងចំនួនគ្រាប់ក្នុង១កូរមានពី១៦៩ ទៅ ២៣៣គ្រាប់។ ពូជផ្កាចំនួនសែនសរ មានទិន្នផលពី ៣.៥តោន ទៅ ៥.០តោនក្នុង១ហិកតា។



២.២. បច្ចេកទេសដាំដុះ

ក. សម្រាប់ស្រូវសន្ទដ

សំណាប: ដើម្បីឲ្យសំណាប និងដើមស្រូវមានសុខភាពល្អ ត្រូវប្រើពូជស្រូវសុទ្ធ និងមាន គុណភាពល្អ ដោយប្រើ ពូជពី២០ ទៅ ៤០គីឡូក្រាមសម្រាប់ស្ទឹង១ហិកតា ។ បើស្ទឹងតាមប្រព័ន្ធប្រពលរប្បកម្មដំណាំស្រូវវិញ ប្រើពូជតែពី១៥ ទៅ ២០គីឡូក្រាមសម្រាប់ស្ទឹង១ហិកតា ។ ថ្នាលសំណាបត្រូវនៅជិតប្រភពទឹកត្រូវរៀបចំដីថ្នាលសំណាបឲ្យបានស្មើល្អ ដោយ កូរនិងរាស់ឲ្យបានច្រើនដង និងកៀរដីថ្នាលរួចប្រើ ជីកំប៉ុស្តពី២ -៣ រទេះគោលើផ្ទៃដីសំណាប។ សាបគ្រាប់ស្រូវ១គីឡូក្រាម លើផ្ទៃដីថ្នាល១០ម៉ែត្រការ៉េ ដើម្បីឲ្យសំណាបដុះលូតលាស់ល្អ ។ សំណាបមានអាយុកាលពី១៥ទៅ២០ថ្ងៃ ត្រូវដកយក ទៅស្ទឹង ដោយដកក្តាមស្ទឹងភ្លាមនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយ។

សន្ទដ: សំណាបមានអាយុកាលពី ១៥-២០ថ្ងៃ ត្រូវដកយកទៅស្ទឹង ដោយដកក្តាមស្ទឹងភ្លាម នៅក្នុងថ្ងៃតែមួយ។ ស្រែសន្ទដត្រូវត្រូវឲ្យបាន ២ ទៅ ៣ដង និងរាស់កៀរដីឲ្យបានរាបស្មើល្អ និងលើកភ្លឺស្រែឲ្យបានខ្ពស់និងជាប់ល្អ និងប្រើជី កំប៉ុស្ត ឬ ជីលាមកគោរល្យល្អពុកល្អចំនួន៥តោន ឬ ២០រទេះគោ និងអាចប្រើជីដេ អា ប៉េ ចំនួន៥០គ.ក្រ ទៅ ១០០គ.ក្រ ទ្រាប់បាត តាមប្រភេទដី។ ស្ទឹង១ដើម ទៅ ៣ដើមក្នុង១គុម្ភជាជួរ ឬមុំច្រាន ដោយស្ទឹងចំនួន១៥ ទៅ ២០ គុម្ភក្នុង១ ម៉ែត្រ ការ៉េ។ បើដីមិនសូវមានជីជាតិអាចស្ទឹងចំនួន១៥ ទៅ ២០ គុម្ភក្នុង១ម៉ែត្រការ៉េ (ចំពោះពូជស្រូវក្រអូប)។ ប្រើជីឱយរ៉ែបំប៉ន លើកទី១ ពី២៥ ទៅ ៥០គ.ក្រក្នុង១ហិកតាក្រោយស្ទឹង៣០ថ្ងៃ និងលើកទី២ពី២៥ ទៅ ៥០គ.ក្រក្នុង១ហិកតា នៅពេលស្រូវ មូរដើម ឬ ពេលស្រូវកកើតកូរ។ បើនៅលើដីល្អាយខ្សាច់វិញ ត្រូវប្រើជីប៉ូតាស្យូមគួរពី២៥ ទៅ ៥០គ.ក្រ ក្នុង១ហិកតា នៅពេលស្រូវមូរដើម ឬ ពេលស្រូវកកើតកូរ។ ក្រោយពេលស្ទឹងរួចរយៈពេល៥ - ៧ថ្ងៃ ត្រូវស្ទឹងជួសគុម្ភណាដែលបាក់ ចុះ មើលស្រែជាប្រចាំ និងបោចស្មៅ គ្រប់គ្រង ថែទាំទឹកក្នុងស្រែ និងត្រួតពិនិត្យ សត្វល្អិត ងងឹត និងសត្វមានប្រយោជន៍នៅក្នុង ស្រែជាប្រចាំ។

ខ. សម្រាប់ស្រូវពង្រោះ

ការរៀបចំដីស្រែពង្រោះ និងព្រោះគ្រាប់ស្រូវ: ត្រូវត្រូវដីឲ្យបានច្រើនដងពី២ ទៅ ៣ដងហើយរាស់កៀរដីឲ្យរាប ស្មើល្អ និងប្រើជីកំប៉ុស្ត ឬជីលាមកគោដែលរល្យល្អពុកល្អចំនួន៣-៥តោន ឬ ១៥ ទៅ ២០ រទេះគោតាមលទ្ធភាពរកបាន។ ព្រោះគ្រាប់ស្រូវពី៧០ ទៅ ១០០គីឡូក្រាមក្នុង១ហិកតា ដោយប្រើឧបករណ៍ព្រោះគ្រាប់ជាជួរ ឬ ព្រោះដោយដៃ មាន ចំនួនដើមស្រូវពី៨០ ទៅ ១២០ដើមក្នុង១ម៉ែត្រការ៉េ ឬចំនួនដើមផ្តល់ផលកូរពី៣០០ ទៅ ៤០០ដើមក្នុង១ម៉ែត្រការ៉េ(IRRI,

2009)។

ការប្រើប្រាស់ដី និងការថែទាំ: បើដីស្រែមិនសូវមានជីជាតិអាចប្រើដីបន្ថែមដោយប្រើជីដេ អា ប៉េ ចំនួន ៥០ ទៅ ១០០គីឡូក្រាម ដីប៉ូតាស្យូម ២៥គីឡូក្រាមក្នុង១ហិកតានៅពេលក្រោយព្រោះ១៥ ទៅ ២០ថ្ងៃ និងប្រើជីបំប៉នលើកទី១ ដោយប្រើជីអ៊ុយរ៉េចំនួន ២៥ គីឡូក្រាមក្នុង១ហិកតាក្រោយពេល ៣០ ថ្ងៃក្រោយពេលព្រោះ និងលើកទី២ ដោយប្រើជី អ៊ុយរ៉េ ចំនួនពី ២៥គីឡូក្រាម និងដីប៉ូតាស្យូមចំនួន២៥គីឡូក្រាមក្នុង១ហិកតា នៅពេលស្រូវម្តងដើម ឬ កកើតកូរ ។ ក្រោយ ពេលព្រោះរួចរយៈ ពេល ១៥ ទៅ ២០ ថ្ងៃ ត្រូវដាំជួសដើមណាដែលបាត់ ហើយចុះមើលស្រែជាប្រចាំ និងបោចស្មៅគ្រប់ គ្រងថែទាំទឹកក្នុង ស្រែ និងត្រួតពិនិត្យ សត្វល្អិត ជំងឺ និងសត្វមានប្រយោជន៍នៅក្នុងស្រែជាប្រចាំ។

២.៣. ការប្រមូលផល និងទុកដាក់គ្រាប់ស្រូវ

ការប្រមូលផលនិងទុកដាក់គ្រាប់ស្រូវ: ត្រូវច្រូតកាត់នៅក្រោយពេលស្រូវចេញផ្កាស្រុះរយៈពេល៣០ទៅ៣៥ថ្ងៃ ឬ ពេលដែលគ្រាប់ស្រូវទុំប្រមាណ៨៥ភាគរយ ពេលគ្រាប់ស្រូវមានសភាពរឹងតែមិនស្រួយបាក់នៅពេលយកមកខាំ និង គ្រាប់ស្រូវមានអត្រាសំណើម២០- ២២ភាគរយ ។ ត្រូវបោកបែនភ្លាមក្រោយពីច្រូតកាត់ និងហាលគ្រាប់ស្រូវ ២-៣ថ្ងៃ ឲ្យ សំណើមគ្រាប់មាន១៤ភាគរយ ឬគ្រាប់ស្រូវស្ងួតល្អមានសភាពរឹង តែមិនស្រួយបាក់នៅពេលខាំ ។ ដើម្បីឲ្យគ្រាប់ស្រូវស្ងួត ល្អ ត្រូវទុកដាក់គ្រាប់ស្រូវក្នុងបារក្រចៅ ឬជង្រុក ដែលជាទីកន្លែងស្ងួត និងមានខ្យល់ចេញចូលបានល្អ និងការពារបាននូវ ការបំផ្លាញពីសត្វល្អិត(ខ្នុត) និងសត្វកណ្តុរ ។ ត្រូវកត់ត្រាថ្ងៃ ខែ ពេលប្រមូលផល នៅលើបារស្រូវ ឬ ជង្រុកស្រូវ ។

៣. ពូជស្រូវធ្ងន់ប្រកាន់រដូវ

៣.១. លក្ខណៈពិសេសរបស់ពូជស្រូវ


ក. ពូជស្រូវរាំងជ័យ

ពូជរាំងជ័យ ជាពូជស្រូវធ្ងន់ ដែលបានបញ្ចេញនិង ផ្សព្វផ្សាយឲ្យ កសិករប្រើប្រាស់ ដោយក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ នៅឆ្នាំ ១៩៩៩ ហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ពូជស្រូវរាំងជ័យ កំពុងពេញនិយម ប្រើប្រាស់ក្នុងផលិតកម្មស្រូវវស្សា ដោយកសិករនៅកម្ពុជា។ ពូជនេះមាន ទិន្នផលខ្ពស់ មានគុណភាពអង្ករល្អប្រសើរ មានភាពភ្លឺថ្លា និងបាយទន់ ល្មម និងឆ្ងាញ់ពិសារ ។

ពូជរាំងជ័យជាប្រភេទ ពូជស្រូវប្រកាន់រដូវមធ្យមចាប់ចេញផ្កានៅ ពាក់កណ្តាលខែវិច្ឆិកា និងច្រូតកាត់នៅពាក់កណ្តាលខែធ្នូនិងដើមខែមករា អាស្រ័យតាមអាកាសធាតុ និងពេលវេលាដាំដុះ។ ពូជនេះមានកំពស់ដើម ពី ១០៥ស.ម - ១៦៨ស.ម ចំនួនដើមបែកផ្តល់ផលពី ៥ ទៅ ១០ដើមក្នុង ១គុម្ព ។ បើក្នុងលក្ខខណ្ឌដីមានជីជាតិល្អ និងអនុវត្តដាំដុះតាមប្រព័ន្ធ ប្រពលវប្បកម្មដំណាំស្រូវចំនួនដើមបែក ផ្តល់ផលអាចមានទៅដល់១៥ - ២០ដើមក្នុង១គុម្ព។ ប្រវែងកូរមានពី១៦ ទៅ ៣០ស.ម និងចំនួនគ្រាប់ក្នុង ១កូរមានពី១៨៦ ទៅ ៣៣៤គ្រាប់ ។ ពូជរាំងជ័យ ជាប្រភេទពូជធ្ងន់ទ្រាំ មធ្យម ទៅនឹងការលិចទឹកជំនន់ តែវាមិនសូវធ្ងន់នឹងមមាចភ្នោតទេ ហើយ មានទិន្នផលពី ៣.៥តោន ទៅ ៥.៥តោនក្នុង១ហិកតា។

ខ. ពូជស្រូវខាង

ពូជខាងជាពូជស្រូវធ្ងន់ ដែលបានបញ្ចេញ និងផ្សព្វផ្សាយឲ្យកសិករប្រើប្រាស់ ដោយក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទនៅឆ្នាំ១៩៩៥ ហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ពូជស្រូវខាងបានកំពុងពេញនិយមប្រើប្រាស់ និងប្រជាកសិករធ្វើការ



ដាំដុះ នៅក្នុងផលិតកម្មរដូវស្រូវវស្សាទូទាំងប្រទេស ជាពិសេសនៅតំបន់ស្រែទឹកជ្រៅ ។ ពូជនេះមានទិន្នផលខ្ពស់ មានគុណភាពអង្ករល្អប្រសើរមានភាពភ្លឺថ្លា បាយទន់ និងឆ្ងាញ់ពិសារទៀតផង។

ពូជខាង ជាប្រភេទពូជស្រូវធ្ងន់ប្រកាន់រដូវ ចាប់ចេញផ្កានៅពាក់កណ្តាលវិច្ឆិកា និងច្រូតកាត់ នៅពាក់កណ្តាលខែធ្នូ អាស្រ័យតាមអាកាសធាតុ និងពេលវេលាដាំដុះ។ ពូជនេះ មានកម្ពស់ដើមពី ១៣២ ស.ម - ១៧៣ ស.ម ចំនួនដើមបែកផ្តល់ផលពី ៦ - ១០ដើមក្នុង១គុម្ភ។ បើក្នុងលក្ខខណ្ឌដីមានជីជាតិល្អ និងអនុវត្តដាំដុះតាមប្រព័ន្ធប្រពលវប្បកម្មដំណាំស្រូវ ចំនួនដើមបែក ផ្តល់ផលអាចមានទៅដល់២០ ទៅ ២៥ដើមក្នុង១គុម្ភ ។ ប្រវែងកូរមានពី២២ ទៅ ២៥ ស.ម និងចំនួនគ្រាប់ក្នុង១កូរមានពី១៦០ ទៅ ១៩០គ្រាប់។ ពូជខាង ជាប្រភេទពូជធ្ងន់ទៅនឹងភាពរាំងស្ងួត ប៉ុន្តែវាមិនសូវធ្ងន់នឹងមមាតភ្នោតទេ ហើយមានទិន្នផលពី ២.៥តោន ទៅ ៥.០តោនក្នុង១ហិកតា។



គ. ពូជស្រូវខាង

ពូជផ្កាខាងជាពូជស្រូវធ្ងន់ ដែលបានបញ្ចេញ និងផ្សព្វផ្សាយឲ្យកសិករប្រើប្រាស់ដោយក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់

និងនេសាទនៅឆ្នាំ២០០៥ ហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ពូជស្រូវខាង កំពុងពេញនិយមប្រើប្រាស់ ក្នុងផលិតកម្មស្រូវវស្សាដោយកសិករនៅទូទាំងប្រទេស។ ពូជនេះមានទិន្នផលខ្ពស់ មានគុណភាពអង្ករល្អមានភាពភ្លឺថ្លា និងបាយទន់ឆ្ងាញ់ពិសារ។

ពូជខាង ជាប្រភេទពូជស្រូវធ្ងន់ប្រកាន់រដូវ ចាប់ចេញផ្កាពីថ្ងៃ៩ - ១៦ ខែវិច្ឆិកា និងច្រូតកាត់ នៅពាក់កណ្តាលទៅចុងខែធ្នូ អាស្រ័យតាមអាកាសធាតុនិងពេលវេលាដាំដុះ។ ពូជនេះមានកំពស់ដើមពី ១២៩ស.ម - ១៧៧ស.ម ចំនួនដើមបែកផ្តល់ផលពី ៧ ទៅ៩ ដើមក្នុង១គុម្ភបើក្នុងលក្ខខណ្ឌដីមានជីជាតិល្អ និងអនុវត្តដាំដុះតាមប្រព័ន្ធប្រពលវប្បកម្មដំណាំស្រូវ ចំនួនដើមបែកផ្តល់ផលអាចមានទៅដល់ ១៥ ទៅ២០ដើមក្នុង១គុម្ភ។ ប្រវែងកូរមានពី២១ ទៅ ២៥ ស.ម និងចំនួនគ្រាប់ក្នុង១កូរមានពី១៥៥ ទៅ ១៨៨ គ្រាប់។ ពូជខាង មានទិន្នផលពី ៣.៥តោន ទៅ ៥.៨តោនក្នុង១ហិកតា។

៣.២ បច្ចេកទេសដាំដុះ

ក. សម្រាប់ស្រូវសន្ទឹង

សំណាប: ដើម្បីឲ្យសំណាប និងដើមស្រូវមានសុខភាពល្អ ត្រូវប្រើពូជស្រូវសុទ្ធ និងមានគុណភាពល្អ ដោយប្រើពូជពី ២០- ៤០គីឡូក្រាមសម្រាប់ស្ទឹង១ហិកតា។ បើស្ទឹងតាមប្រព័ន្ធប្រពលវប្បកម្មដំណាំស្រូវវិញ ប្រើពូជតែពី ១៥ - ២០ គីឡូក្រាមសម្រាប់ស្ទឹង១ហិកតា ។ ថ្នាលសំណាបត្រូវនៅជិតប្រភពទឹក ត្រូវរៀបចំដីថ្នាលសំណាបឲ្យបានស្មើល្អដោយកូរ និងរាស់ឲ្យបានច្រើនដង និងកៀរដីថ្នាលរួចប្រើ ជីកំប៉ុស្តពី២ ទៅ ៣រទេះគោលើផ្ទៃដីសំណាប។ សាបគ្រាប់ស្រូវគីឡូក្រាមលើផ្ទៃដីថ្នាល១០ម៉ែត្រការ៉េ ដើម្បីឲ្យសំណាបដុះលូតលាស់ល្អ ។ សំណាបមានអាយុកាលពី១៥- ២០ថ្ងៃ ត្រូវដកយកទៅស្ទឹង ដោយដកក្តាមស្ទឹងភ្លាមនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយ។

សន្ទឹង: សំណាបមានអាយុកាលពី១៥ - ២០ថ្ងៃ ត្រូវដកយកទៅសន្ទឹងដោយដកក្តាមស្ទឹងភ្លាមនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយ។ ស្រែសន្ទឹងត្រូវកូរឲ្យបាន២- ៣ដង និងរាស់កៀរដីឲ្យបានរាបស្មើល្អ និងលើកភ្លឺស្រែឲ្យបានខ្ពស់និងជាប់ល្អ និងប្រើជីកំប៉ុស្ត ឬជីលាមកគោរលួយពុកល្អចំនួន៥តោន ឬ ២០រទេះគោ និងអាចប្រើជីដេ អា ប៉េ ចំនួន៥០គ.ក្រ ទៅ ១០០ គ.ក្រ ទ្រាប់បាតទៅតាមប្រភេទដី។ ស្ទឹង១ដើម ទៅ ៣ដើមក្នុង១គុម្ភជាជួរ ឬ មុំចង្រាន ដោយស្ទឹងចំនួន១០ ទៅ ១៥ គុម្ភក្នុង១ម៉ែត្រការ៉េ ។ បើដីមិនសូវមានជីជាតិអាចស្ទឹងចំនួន១៥ ទៅ ២០ គុម្ភក្នុង១ម៉ែត្រការ៉េ។ ដីបំប៉នអាចប្រើពី២-៣លើកគឺបំប៉នលើកទី១ប្រើជីអ៊ុយរ៉េ ២៥ គ.ក្រក្នុង១ហិកតា ក្រោយស្ទឹង៣០ថ្ងៃ បាចដីបំប៉នលើកទី២ ប្រើជីអ៊ុយរ៉េ២៥ គ.ក្រ ក្នុង១ហិកតា នៅពេលក្រោយបាចដីបំប៉នលើកទី១ ៣០ថ្ងៃ និងលើកទី៣ ប្រើជីអ៊ុយរ៉េ ២៥ គ.ក្រក្នុង១ហិកតា នៅពេលស្រូវម្តងដើម ឬពេលស្រូវកកើតកូរ។ បើនៅលើដីល្បាយខ្សាច់វិញ ត្រូវប្រើជីប៉ូតាសស្រូវ៧២៥ ទៅ ៥០គ.ក្រក្នុង១ហិកតានៅពេលស្រូវម្តងដើម ឬ

ពេលស្រូវកើតកូរ។ ក្រោយពេលស្លុងរួចរយៈពេល៥ ទៅ ៧ថ្ងៃ ត្រូវស្លុងជួសគុណណាដែលបាត់ ចុះមើលស្រែជាប្រចាំ និង បោចស្មៅ គ្រប់គ្រងថែទាំទឹកក្នុងស្រែ និងត្រួតពិនិត្យ សត្វល្អិត ជំងឺ និងសត្វមានប្រយោជន៍នៅក្នុងស្រែជាប្រចាំ។

១. សម្រាប់ស្រូវពង្រៃ:

ការរៀបចំដីស្រែពង្រៃ: និងព្រោះគ្រាប់ស្រូវ: ត្រូវភ្ជួរដីឲ្យបានច្រើនដងពី២-៣ ដង ហើយរាស់កៀរដីឲ្យរាបស្មើ ល្អ និងប្រើដីកំប៉ុស្ត ឬដីលាមកគោដែលរលួយពុកល្អិតចំនួន៣-៥គោន ឬ ១៥ - ២០រទេះគោតាមលទ្ធភាពបាន ។ ព្រោះ គ្រាប់ស្រូវពី៧០ ទៅ ១០០គីឡូក្រាមក្នុង១ហិកតា ដោយប្រើឧបករណ៍ព្រោះគ្រាប់ជាដូរ ឬ ព្រោះដោយដៃ ឲ្យមានចំនួន ដើមស្រូវពី១០០ ទៅ ១៥០ ដើមក្នុង១ម៉ែត្រការ៉េ (IRRI, 2009)។

ការប្រើប្រាស់ដី និងការថែទាំ: បើដីស្រែមិនសូវមានដីជាតិអាចប្រើដី បន្ថែមដោយប្រើដីដេ អា ប៉េ ចំនួន ៥០-១០០ គីឡូក្រាមដីប៉ូតាស្យូម២៥គីឡូក្រាមក្នុង១ហិកតានៅពេលក្រោយព្រោះ១៥ - ២០ថ្ងៃ និងប្រើដីបំប៉នលើកទី១ ដោយប្រើដីអ៊ុយរ៉េ ចំនួន ២៥គីឡូក្រាមក្នុង១ហិកតា ៣០ ថ្ងៃក្រោយពេលព្រោះ និងលើកទី២ ដោយប្រើដីអ៊ុយរ៉េ ចំនួន ពី២៥ គ.ក្រ និង ដីប៉ូតាស្យូមចំនួន២៥គីឡូក្រាមក្នុង១ហិកតានៅពេលស្រូវម្តងដើម ឬ កកើតកូរ ។ ក្រោយពេលព្រោះរួចរយៈពេល ១៥-២០ថ្ងៃ ត្រូវដាំជួសដើមណាដែលបាត់ ហើយចុះមើលស្រែជាប្រចាំ និងបោចស្មៅ គ្រប់គ្រងថែទាំទឹកក្នុងស្រែ និងត្រួតពិនិត្យ សត្វ ល្អិត ជំងឺ និងសត្វមានប្រយោជន៍នៅក្នុងស្រែជាប្រចាំ។

៣.៣. ការប្រមូលផល និងទុកដាក់គ្រាប់ស្រូវ

ការប្រមូលផលនិងទុកដាក់គ្រាប់ស្រូវ: ត្រូវច្រូតកាត់នៅក្រោយពេលស្រូវចេញផ្កាស្រុះរយៈពេល៣០ ទៅ ៣៥ថ្ងៃ ឬ ពេលដែលគ្រាប់ស្រូវទុំប្រមាណ៨៥ភាគរយ ពេលគ្រាប់ស្រូវមានសភាពរឹង តែមិនស្រួយបាក់នៅពេលយកមកខាំ និង គ្រាប់ស្រូវមានអត្រាសំណើម២០- ២២ភាគរយ ។ ត្រូវបោកបែនភ្លាមក្រោយពីច្រូតកាត់ និងហាលគ្រាប់ស្រូវ២-៣ ថ្ងៃ ឲ្យ សំណើមគ្រាប់មាន១៨ភាគរយ ឬគ្រាប់ស្រូវស្ងួតល្អមានសភាពរឹង តែមិនស្រួយបាក់នៅពេលខាំ។ ដើម្បីឲ្យគ្រាប់ស្រូវស្ងួត ល្អ ត្រូវទុកដាក់គ្រាប់ស្រូវក្នុងបារក្រចៅ ឬជង្រុក ដែលជាទឹកនៃឆ្នែងស្ងួត និងមានខ្យល់ចេញចូលបានល្អ និងការពារបាននូវ ការបំផ្លាញពីសត្វល្អិត(ខ្នុត) និងសត្វកណ្តុរ ។ ត្រូវកត់ត្រាថ្ងៃ ខែ ពេលប្រមូលផល នៅលើបារស្រូវ ឬ ជង្រុកស្រូវ ។

ឯកសារយោង

1. វិទ្យាស្ថានស្រូវប្រារ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានកសិករ ឆ្នាំទី១លេខ០១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០០២, ឆ្នាំទី១លេខ៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០២ ឆ្នាំទី៣លេខ២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៤, ឆ្នាំទី៣ លេខ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៤, ឆ្នាំទី៥ លេខ៤៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៥, ឆ្នាំទី៥លេខ៤៩ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០០៦, ឆ្នាំទី៦លេខ៥៤ ខែ មីនាឆ្នាំ ២០០៧, ឆ្នាំទី៦ លេខ៥៩ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០០៧, ឆ្នាំទី៩លេខ៩២ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១០ និង ឆ្នាំទី៩លេខ៩៨ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១០។
2. ម៉ាក់ សៀន យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងជីជាតិដី នៅក្នុងតំបន់ក្សេត្របរិស្ថានដំណាំស្រូវស្រែទំនាបពឹងដោយទឹកភ្លៀងនៅកម្ពុជា ខែ មេសា ឆ្នាំ២០១០, ១០៦ទំព័រ។
3. រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា គោលនយោបាយជំរុញផលិតកម្មស្រូវ និងជំរុញការនាំចេញអង្ករ ថ្ងៃទី១៧ ខែ សីហាឆ្នាំ២០១០។
4. Buresh J R., (2009).Site-Specific Nutrient Management (SSNM): An Approach for Optimizing Nutrient Use in Rice Production., IRRI, Philippines. www.irri.org/irrc/ssnm;
5. International Rice Research Institute (IRRI). (2009) Rice Knowledge Bank. Good Agricultural Practices (GAP) for Irrigated and Rainfed Rice, Philippines. www.knowledgebank.irri.org;
6. Men Sarom., Chaudhary R.C., Javier E., Ouk M.,Sakhan S., Hun Y., Pith K H., Sidhu G S., Sin S., Say P., Ung S.P., Preap. V.,(2001). Discription of Rice Varieties Released by Rice Recommendation Committee of Cambodia (1990-2000), CARDI, Phnom Penh, Cambodia. 75p