

# ដំណាំម្ចាស់

## ១-ការរៀបចំដី:

យើងត្រូវភ្ជួរដីឲ្យបានស្អាត ទុកចោល ១សប្តាហ៍ បន្ទាប់មកកាយចង្កូរ ឬភ្ជួរតូតដែល មានបណ្តោយ ២០ ម៉ែត្រ និងចន្លោះចង្កូរប្រវែង ១ម៉ែត្រ រួចដាក់ដីអាចម៍គោ តាមចង្កូរហើយ លប់ដីពីលើ។

## ២- ការដាំម្ចាស់

យើងដាំកូនម្ចាស់ពីលើចង្កូរដែលដាក់ដី អាចម៍



កប់គល់ចូលដី១តឹក

គោ ដែលមានចន្លោះពីគុម្ពមួយទៅគុម្ពមួយ ប្រវែងពី ៣ ទៅ ៤តឹក និងចន្លោះរង ប្រវែង ពី៦ ទៅ ៨តឹក។ យើង ត្រូវកប់គល់កូនម្ចាស់ចូលទៅក្នុងដីប្រមាណ ១តឹក។

## ៣- ការសំរោតស្មៅ ពូនគល់ និងការគ្របដី:

ស្មៅចាប់ផ្តើមដុះក្រោយយើងដាំរួចរយៈ ពេល ១ខែ យើងត្រូវត្រួតពិនិត្យមើល បើឃើញថា មានស្មៅ ដុះកំពស់កូនម្ចាស់ យើងចាំបាច់ ត្រូវធ្វើការជំរះស្មៅចេញ រួចពូនរងនិងយកស្មៅងាប់ ឬដើមកន្ទ្រាំងខែត្រ ឬអង្គុម ដាក់ពីលើរងអោយបានច្រើន ដើម្បីអោយកើតជាដី និង បន្ថយការលូតលាស់របស់ស្មៅ។

## ៤- ការដាក់ដី:

- \* ការដាក់ដីទ្រាប់បាត: យើងដាក់ដីលាមកសត្វ ប្រមាណ៣ការុង ឬ៣០គីឡូក្រាមពីលើចង្កូរ រងប្រវែង២០ម៉ែត្ររួចកាប់ជ្រោយ អោយបាន សព្វមុនពេលដាំ។
- \* ការដាក់ដីបំប៉ន: យើងប្រើដីអ៊ុយរ៉េ២ដង និង ដី២០-២០-១៥ ១ដងសំរាប់បំប៉នដើមម្ចាស់ឲ្យ លូតលាស់ល្អ។ ត្រូវសំរោតស្មៅឲ្យបានស្អាត ជាមុនសិន និងត្រូវដាក់ដី ក្រោយភ្លៀងធ្លាក់ សំរាប់រដូវវស្សា។ នៅរដូវប្រាំងយើងត្រូវយក ដីអ៊ុយរ៉េចំនួន កន្លះគីឡូ ក្រាម លាយទឹក១ធុង

ចំណុះ២០លីត្រ សំរាប់កូនម្ចាស់ ១០០ដើម។ ត្រូវចាក់ស្រោច តាមគល់កុំឲ្យទឹកដីចូលក្នុង បណ្តាលដើមម្ចាស់។



- \* លើកទី១: ត្រូវដាក់ដីក្នុងរយៈពេល១ ខែ កន្លះ ក្រោយដាំ ប្រើដីអ៊ុយរ៉េ១គ.ក្រ សំរាប់កូនម្ចាស់ ២០០ ដើម។
- \* លើកទី២: ត្រូវដាក់ដីក្នុងរយៈពេល ២ខែក្រោយ លើកទី១ ប្រើដីអ៊ុយរ៉េ ម្តងទៀត១គ.ក្រ សំរាប់ កូនម្ចាស់ ២០០ ដើម។
- \* លើកទី៣: ពេលម្ចាស់ចាប់ផ្តើមចេញផ្កា ប្រើ ដី២០-២០-១៥ ១គ.ក្រ សំរាប់កូនម្ចាស់២០០ ដើម។
- \* ចំណាំ: យើងអាចប្រើដីទឹកនោម ត្រាំជាមួយ



លាមកសត្វ និងដើមកន្ត្រាំងខែត្រ ដោយចាក់ស្រោចតាមគល់ជំនួសជីអ៊ុយរ៉េក៏បាន។ យើងប្រើទឹកជី១ធុងចំណុះ២០លីត្រ សំរាប់ម្ចាស់ ១០០ដើម។



ត្រូវយកដីលប់ពីលើដី

**៥- ស្រោចស្រព:**

បើយើងដាំកូនម្ចាស់នៅរដូវប្រាំង យើងត្រូវស្រោចទឹកពន្លឺចរងក្រោយដាំរួច និងត្រូវស្រោចវារៀងរាល់ ១ខែម្តង រហូតដល់ភ្លៀងធ្លាក់។

**៦- ការចំណីសំណេតខ្លី៖**

ជាធម្មតាពូជម្ចាស់ស្រុកយើងពុំសូវឃើញ មានខ្លាំងកូននៅពេលដើមម្ចាស់ កំពុងលូលាស់ទេ ប៉ុន្តែយើងគួរតែត្រួតពិនិត្យមើលបើឃើញមានខ្លាំង ត្រូវកាច់ចេញដោយទុកតែដើមមួយប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីអោយបានផ្លែធំ។

**៧- ខំរុញផ្កា:**

ដើមម្ចាស់អាចចាក់ថ្នាំស្ករបានលុះត្រាតែវា មាន


ដើមធំល្អដែលមានស្លឹកលើសពី២០ឡើងទៅ។ យកថ្នាំស្ករលេខ១១ចំនួន ៣ខាំលាយជាមួយ ទឹក១ ធុងចំណុះ ២០លីត្រ រួចយកទឹកល្អាយនេះចាក់ចូល ក្នុងបណ្តាលដើមម្ចាស់ទាល់តែពេញ។ ជាធម្មតា ល្អាយទឹកថ្នាំស្ករ ២០លីត្រ អាចចាក់បាន៣រង ប្រវែង២០ម៉ែត្រ។ ក្រោយចាក់ថ្នាំស្កររយៈពេល ៤ ខែ២០ថ្ងៃទើបម្ចាស់ទុំអាចកាច់យកលក់បាន។



ចាក់ល្អាយទឹកថ្នាំស្ករទាល់តែពេញ

**ឯកសារពិគ្រោះ៖**

- Traing module on fruit tree production, 2013 (គណៈកម្មការអភិវឌ្ឍន៍ដំណាំឈើហូបផ្លែ នៅខេត្តតំបន់ពាយព្យ)
- បទពិសោធន៍ ងួន ង៉ាន់ កសិករដាំម្ចាស់, 2011 (ឃុំព្រែកជីក ស្រុកមោងឫស្សី ខេត្តបាត់ដំបង)



**ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ**  
**នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម**

**បទពិសោធន៍ដោះស្រាយ**  
**ក្នុងការដាំម្ចាស់ របស់កសិករកំរុ**



**សហការផលិតដោយ៖**

**នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម និងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចអប់រំ ខេត្តសៀមរាប**  
**ឆ្នាំ២០១៣**