



1

# គម្រោងបង្ការការបាត់បង់ដីស្រែ និងការកែលម្អផលិតផលកសិកម្មស្រូវ



## បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រះ



ស្រះចាស់

### ១. ការរៀបចំស្រះមុនដាក់ត្រីចិញ្ចឹម

- សម្ភារៈមាន ម៉ាស៊ីនបូមទឹកមួយកំប្លោក កំបោរ ជីគីមី ជីលាមកគោ កំលាំងពលកម្ម
- ក ស្រះចាស់:**
- បូមពង្រឹងចាប់ពពួកត្រីកាច ស្តារភក់ឲ្យនៅត្រឹម ១-២តីក សំអាតស្មៅ លុបរន្ធក្តាម កង្កែប ពស់ នៅតាមជើងទេរ រៀបចំជួសជុលជើងទេរ និង ភ្លីស្រះ ពី ១-២ម អាស្រ័យលើប្រភេទដី
  - កំបោរស បរិមាណ ១០គក្រ/១០០ម<sup>២</sup> បាចពាសពេញផ្ទៃស្រះ រួចហាល ៣ថ្ងៃ
  - ជីលាមកគោ ៥០គក្រ/១០០ម<sup>២</sup>
  - ជីគីមី (អ៊ុយរ៉េ ០.៧គក្រ និង ដេអាប៉េ ០.៣គក្រ)/១០០ម<sup>២</sup>



ល្បាយជី អ៊ុយរ៉េ និង ដេអាប៉េ



សកម្មភាពស្តារភក់បាតស្រះ



សកម្មភាពលាយកំបោរសំលាប់ត្រីកាច និងពពួកសត្វចង្រៃក្នុងស្រះ




សកម្មភាពបាចជីលាមកគោទ្រាប់បាតស្រះដើម្បីបង្កើតចំណីធម្មជាតិ





# តម្រូវការបង្ការការបង្កើនផលិតផលកសិកម្មតំបន់ឧទ្ទេសាម



- ខ ស្រះថ្មី** របៀបដីកស្រះគឺត្រូវ
- ✓ កំណត់ទំហំស្រះ: ១០០-៥០០ម<sup>២</sup>
  - ✓ លក្ខណៈភ្លឺស្រះ: ៦០សម
  - ✓ កំណត់ទំហំខ្ពងភ្លឺ
  - ✓ ជើងទេរភ្លឺស្រះ:
  - ✓ ជើងទេរស្រះ: ពី ២.៥០-៣ម
  - ✓ កំពស់ខ្ពងភ្លឺស្រះ: ១

## ២ ការដាក់កូនត្រីចិញ្ចឹម

### ក ប្រភេទត្រីដាក់ចិញ្ចឹម

- ប្រភេទត្រីងាយស្រួលចិញ្ចឹម ងាយរកពូជមកចិញ្ចឹម ធនធានជំងឺ ស៊ីចំណីធម្មជាតិ និងចំណីបន្ថែមដែលអាចរកបាន មានតម្លៃក្នុងទីផ្សារ ប្រជាជននិយមបរិភោគ
- ឆ្កិន ទីឡាព្យា កាបមញ្ញ កាមតណ្ហា កាបស កន្ទុរ

### ខ ការពិនិត្យគុណភាពកូនត្រីពូជ

- លក្ខណៈកូនត្រីពូជល្អ ៖ សកម្មភាពហែលរហ័សរហួន
- ពេលឃើញមនុស្ស ឬ សត្រូវ កូនត្រីមានសកម្មភាពហែល គេចខ្លួនយ៉ាងលឿនចុះទៅបាតស្រះ
- ករណីហែលផ្គុំក្បាលគ្នានៅត្រង់ចំណុចកណ្តាលស្រះមុនពេលថ្ងៃរះ និង ក្រោយថ្ងៃរះហែលចុះទៅស្រទាប់ទឹកបាតស្រះ ។



ត្រីទីឡាព្យាក្រហម



ត្រីកាបសាមញ្ញ



ត្រីទីឡាព្យា



ត្រីទីឆ្កិន



ត្រីកាបតណ្ហា



ពូជត្រីទីឡាព្យាក្រហមល្អ



# ការប្រមូលបង្ការបង្កើនផលិតផលកសិកម្ម ដើម្បីបង្កើនផលិតផលកសិកម្ម ជំនួយបង្កើនផលិតផលកសិកម្ម



កូនត្រីពូជអូសចេញពីស្រះផ្សារ



ការផ្សារកូនត្រីពេលដឹកជញ្ជូន



ការវិចខ្ចប់កូនត្រីពូជ



សកម្មភាពដឹកជញ្ជូនកូនត្រីពូជ



សកម្មភាពប្រគល់កូនត្រីពូជជូនកសិករ



សកម្មភាពលែងកូនត្រីចូលក្នុងស្រះ



### ៣.៤ ដងស៊ីតេត្រីដាក់ចិញ្ចឹម

- ដងស៊ីតេ(៣ក្បាល/ម<sup>២</sup>) និងមានទំហំសមស្រប
- (៥-១០សម) ចិញ្ចឹមពាក់កណ្តាលប្រពលវប្បកម្ម ។
- ដងស៊ីតេចិញ្ចឹមសមស្របច្រើនបំផុត(៥ក្បាល/ម<sup>២</sup>)

### ៣.៥ ចំនួនកូនត្រីដាក់ចិញ្ចឹម

- ករណីត្រីឆ្អិនជាប្រភេទសំខាន់៖
  - ឆ្អិន=៥០% ទីឡាព្យា=៤០% និង
  - កាបសាមញ្ញ /កាបឥណ្ឌា=១០%
- ករណីត្រីឆ្អិនជាប្រភេទសំខាន់៖
  - ទីឡាព្យា=៥០% ឆ្អិន=៤០% និង
  - កាបសាមញ្ញ /កាបឥណ្ឌា=១០%



# ការប្រើប្រាស់បង្ការបង្កើនផលិតផលតាមដំណាក់កាលដំបូង



- ៣.៦ ទំហំកូនត្រីសមស្រប**
- ទីឡាព្យា            ៖ ៥សម-៨សម
  - កាបឥណ្ឌា        ៖ ៨សម-១០សម
  - ឆ្អិន                 ៖ ៥សម-៨សម
  - កាបសាមញ្ញ      ៖ ៥សម-៨សម



**៣.៧ ការដាក់ជីក្រោយដាក់ចិញ្ចឹម**

ក្រោយពីដាក់កូនត្រីចិញ្ចឹមរយៈពេលពី ១០-១៥ថ្ងៃ ត្រូវពិនិត្យមើលទឹកស្រះ បើពិនិត្យឃើញទឹកស្រះពណ៌បៃតងចាស់ មានន័យថាស្រះមានចំណីធម្មជាតិប្លង់តុង តែបើឃើញទឹកស្រះលែងមានពណ៌បៃតង នោះយើងត្រូវបន្ថែមជីដែលបានរៀបចំក្នុងរណ្តៅស្រាប់។



- ៣.៧.១ ជីធម្មជាតិ**
- លាមកគោ/ក្របី ជ្រូក មាន់/ទា ពពួករុក្ខជាតិបៃតង(ទន្លេខ្លាងខែត្រ ជ្វី សង្កែកន្ទុំថេត...។ វិធីសាស្ត្រធ្វើជីកំប៉ុស្តិ៍ធម្មជាតិ មានដូចខាងក្រោម៖
- **ការដីករណ្តៅជី** មានទំហំ=១.៥មx២មx០.៨ម អាចធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពកសិករដូចជា៖ ដីកជាររណ្តៅផ្ទាល់ដី ប្រើពាង លូខ្លោះអណ្តូងក៏បាន ។ នៅបាតរណ្តៅត្រូវធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យទឹកជីជ្រាបទៅក្រោមបាន។ រណ្តៅជីត្រូវភ្ជាប់ទុយោចនោះប្រហែល ២ តីកពីបាតរណ្តៅ ដោយមាន វ៉ាន ឬឆ្នុក បិទ/បើក ដើម្បីបង្ហូរទឹកជីទៅក្នុងស្រះ។
  - **ការរៀបចំកំប៉ុស្តិ៍ក្នុងរណ្តៅជី**
    - បរិមាណលាមកគោ មាន់ ទា =១០០គក្រ/១០០ម<sup>២</sup> និង
    - បរិមាណរុក្ខជាតិបៃតង (ទន្លេខ្លាងខែត្រ ជ្វី សង្កែក កន្ទុំថេត...) គឺ ៨០គក្រ/១០០ម<sup>២</sup> ។



# តម្រូវការបច្ចុប្បន្នបច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីបង្កើនផលិតផលព័ទ្ធជាមតិកសិកម្ម



សកម្មភាពថ្លឹងជីគីមី



ការថ្លឹងជីអុយរ៉េតាមទំហំស្រះ



ល្បាយជីអុយរ៉េ និងជីដេអាប៉េ

### ៣.៧.២ ជីគីមី

ជីគីមីក៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការបង្កើតប្លង់តុង ។

បរិមាណជីគីមីប្រើប្រាស់សំរាប់ស្រះចិញ្ចឹមត្រីគឺ៖

- ជីអុយរ៉េ ០.៧ គក្រ ក្នុង១០០ម<sup>២</sup> និង
- ជីដេអាប៉េ ០.៣ គក្រ ក្នុង១០០ម<sup>២</sup>

មុនពេលដាក់ជី ត្រូវលាយ អុយរ៉េ និង ដេអាប៉េ ជាមួយទឹករួចក្រូចរលាយ



ទឹកស្រះពណ៌បៃតងចាស់



ទឹកស្រះពណ៌បៃតងខ្ចី



ទឹកស្រះល្អក់



ទឹកស្រះថ្លា

### ៤ ការគ្រប់គ្រងគុណភាពទឹក

ក្រោយពីដាក់កូនត្រីចិញ្ចឹម រយៈពេលពី១០-១៥ថ្ងៃ យើងត្រូវពិនិត្យគុណភាពទឹកស្រះ ឡើងវិញបើឃើញថាទឹកលែងមានពណ៌បៃតង នោះយើងត្រូវបន្ថែមជីភ្លាមដោយប្រើ រណ្តៅដែលបានរៀបចំទុកជាស្រេច។


#### ៤.១ ការពិនិត្យពណ៌ទឹកដោយភ្នែកទទេ

- ទឹកស្រះមានពណ៌បៃតងខ្ចី មានន័យថា កកើតចំណីធម្មជាតិគ្រប់គ្រាន់
- ទឹកស្រះមានពណ៌បៃតងចាស់ មានន័យថា កកើតចំណីធម្មជាតិច្រើនពេក ដូច្នេះ ត្រូវបញ្ឈប់ការដាក់ជីធម្មជាតិមួយរយៈសិនបើមិនដូច្នោះទេនឹងធ្វើឲ្យត្រីពុល ឬងាប់ ។
- ទឹកស្រះល្អក់ដោយសារដី នោះពុំមានចំណីធម្មជាតិទេ ជាហេតុធ្វើឲ្យត្រីធំធាត់យឺត
- ទឹកថ្លាមានន័យថា ខ្សត់ចំណីធម្មជាតិ ដូច្នេះត្រូវបន្ថែមជី



៦

គម្រោងបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីបង្កើនផលិតផលព្រៃឈើ និងសុខភាពដីធ្លី



សកម្មភាពកសិករពិនិត្យគុណភាពទឹក និង វ៉ាស់ pH ទឹកដោយប្រើក្រដាសទូណីសុល

**លំហាស និងប្រសិទ្ធភាព ទៅលើការរស់នៅរបស់ត្រី**

លំហាស(pH)	ប្រសិទ្ធភាព
៤	អាស៊ីតខ្លាំង
៤-៦	ត្រីលូតលាស់យឺត
៦-៩	ត្រីលូតលាស់ល្អប្រសើរ
៩-១១	ត្រីលូតលាស់យឺត(រយៈពេលយូរទៅនាំអោយត្រីងាប់)
១១+	អាល់កាឡាំងខ្លាំង



សកម្មភាពកសិកររៀបចំជីកំប៉ុស្តិ៍ និងបង្កូរទឹកដីចូលក្នុងស្រះចិញ្ចឹមត្រី

**៤.៣ ការផ្តល់ចំណី**

ចំណីមានពីរប្រភេទ: ចំណីធម្មជាតិ និងចំណីបន្ថែម។

**៤.៣.១ ចំណីធម្មជាតិ**

- មានដូចជា ប្លង់តុងសត្វ ប្លង់តុងរុក្ខជាតិ និងសត្វរស់នៅស្រទាប់បាត មានខ្យងខ្លោងជន្លេនក្រហមជាដើម។
- ចំណីធម្មជាតិ គឺកំប៉ុស្តិ៍លាមកគោ/ក្របី មាន់/ទា ជ្រូក និងពពួករុក្ខជាតិបែតងជាដើម ឬអាចជាចំណីបន្ថែមផងដែរ។ បើកបង្កូរទឹកដីដោយផ្ទាល់ចេញពីរណ្តៅដីឬដងបាចទៅលើផ្ទៃស្រះធ្វើដូចនេះទឹកដីមានល្បាយសព្វពេញស្រះ នៅពេលដែលមានកំដៅថ្ងៃល្អ រយៈពេល ២-៣ ថ្ងៃក្រោយមកប្លង់តុងសត្វ និង ប្លង់តុងរុក្ខជាតិបានកើតពេញស្រះដែលជាចំណីធម្មជាតិសំរាប់ត្រី។



# តម្រូវការបច្ចុប្បន្នបច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីបង្កើនផលិតផលពង្សាស៊ីស្តូមសំបក់ឆ្នោត



## សកម្មភាពកសិកររៀបចំ ចំណីបន្ថែម សំរាប់ការចិញ្ចឹមត្រី



កាកសំណល់បន្លែបៃតង



កណ្តៀវ



ចកបាយទា



ចំណីផ្សំពី កន្ទក់ ម្សៅត្រី ត្រកូន កាកដូង



ម្សៅត្រី



កន្ទក់



កាកដូង



ត្រកូន



កាកសំណល់ត្រី

### ៤.៣.២ ចំណីបន្ថែម

- បានមកពីការផ្សំចំណីច្រើនប្រភេទដូចជា: កន្ទក់ ចុងអង្ករ ម្សៅត្រី ពោត សណ្តែក ឬចំណីគ្រាប់ជាដើម ។
- ចំណីដែលអាចរកបាននៅក្នុងភូមិមាន ចកបាយទា ចៃទឹក កណ្តៀវ ជន្លេន កាកសំណល់ផ្ទះបាយ កាកសំណល់បន្លែ និងកាកសំណល់ពីទឹកស្អុយជាដើម ។ល។
- ផ្តល់ចំណីដែលផ្សំពីកន្ទក់ ម្សៅត្រី ចុងអង្ករ ពោត សណ្តែក ត្រូវចំអិនឲ្យឆ្អិន ទុកឲ្យត្រជាក់រួច ពូកជាដុំដាក់ក្នុងកញ្ចប់ពន្លឺចក្នុងទឹកជម្រៅ ០.៥ ម៉ែត្រ។
- ត្រូវកំណត់ទីតាំងផ្តល់ចំណីឱ្យបានច្បាស់លាស់
- បរិមាណចំណីផ្តល់ឲ្យត្រីស៊ីប្រែប្រួលទៅតាមទំហំត្រី គឺពី ៣ ទៅ៥% នៃទំងន់ត្រីសរុបក្នុងស្រះ
- ផ្តល់ចំណីជាទៀងទាត់បរិមាណពី ២០-២៥គក្រ/ស្រះ ទំហំពី ៣០០-៥០០ម<sup>២</sup> /ថ្ងៃ នៅចន្លោះម៉ោង ៩-១១ព្រឹក និងពេល



# តម្រូវការបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីបង្កើនផលិតផលព្រៃក្នុងតំបន់ឧទ្ទេសាម



ជញ្ជីងទំងន់ ១គក្រ



បន្ទាត់ខ្នាតជា ស.ម



តសំណាញ់ក្រឡាញឹក



ចានដែកដាក់ត្រី



ទូណីសុលវ៉ាស់ pH



សៀវភៅកត់ត្រាទិន្នន័យ

## ៥ តាមដានការលូតលាស់ត្រី

ធ្វើរៀងរាល់១ខែម្តង ដើម្បីត្រួតពិនិត្យទៅលើប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំខាន់ៗ ដែលទាក់ទងនឹងកត្តាធំៗរបស់ត្រី នោះគឺ pHទឹក គុណភាពទឹក ជាដើម។ល។

សកម្មភាពនេះអាចឲ្យយើងដឹង៖

- ត្រួតពិនិត្យអំពីជំងឺត្រី
- អត្រាលូតលាស់ត្រី គណនាបរិមាណចំណីបន្ថែមដែលត្រូវផ្តល់ ទៅតាមទំហំម៉ាសរបស់ត្រី
- ប៉ាន់ស្មាន/អត្រាគង់វង្សត្រីក្នុងស្រះ

## ៥.១ ត្រៀមរៀបចំសំភារៈ

- ឧបករណ៍សំរាប់ចាប់ត្រី- មានថ្នងដង សំណាញ់ អូនសំរាប់កៀរ
- ឧបករណ៍សំរាប់វាស់ ថ្លឹង- បន្ទាត់មានក្រឹត(សង់ទីម៉ែត្រ) ជញ្ជីងទំងន់ (១ ឬ ២ គីឡូក្រាម)
- សៀវភៅកត់ត្រាទិន្នន័យ
- ឧបករណ៍សំរាប់វាស់ pH ទឹក





# ការវាស់ស្ទង់ទម្ងន់ និង វាស់វែងវែងស្រទាប់ ដើម្បីបង្កើនផលិតផលពង្សាពូជស្រទាប់



ទម្ងន់ត្រីឆ្កែចិញ្ចឹម ២ខែ



ទម្ងន់ត្រីកាបសាមញ្ញចិញ្ចឹម ២ខែ



ទម្ងន់ត្រីទីឡាព្យាចិញ្ចឹម ២ខែ



ប្រវែងត្រីឆ្កែចិញ្ចឹម ២ខែ



ប្រវែងត្រីកាបសាមញ្ញចិញ្ចឹម ២ខែ



ប្រវែងត្រីទីឡាព្យាចិញ្ចឹម ២ខែ

## ៥.២ ការយកគំរូ និង វាស់វែងត្រី

ចាប់ត្រីដោយប្រើឧបករណ៍សំណាញ់ នៅទីតាំងខុសៗគ្នាចំនួន៣កន្លែង នៃស្រះ ការវាស់វែងប្រភេទត្រី ទីឡាព្យា ឆ្កែ និងកាបសាមញ្ញ។

- រៀបចំអូនដាក់ក្នុងទឹកនៅនឹងកែងស្រះជាស្រេច គឺធ្វើលើទីតាំងផ្តល់ ចំណីនោះដែលអាចយើងចាប់ត្រីពីក្នុងសំណាញ់យកមកវាស់វែង ។
- ថ្លឹងទម្ងន់ និងវាស់វែងប្រវែងរួចកត់ត្រាចូលក្នុងសៀវភៅ។
- ការយកគំរូត្រីត្រូវ យកនៅ៣ ទីតាំងខុសៗគ្នា ដែលមួយលើកៗ យកពី ១០-២០ត្រីតាមប្រភេទនីមួយៗ
- ក្នុងករណីត្រីមានរោគសញ្ញា ឬជំងឺត្រូវយកចេញដើម្បីសាកសួរអ្នក ជំនាញ



# ការប្រមូលផលប្រមូលផល ដើម្បីបង្កើនផលិតផលពូជសាសន៍សត្វក្នុងស្រុក

## ៦.១ ការប្រមូលផលរំលោះ

- ជាទូទៅ ការចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រះចម្រុះអាចប្រមូលផលបានចាប់ពីរយៈពេល ៨ខែ-១ឆ្នាំ នឹងត្រូវប្រមូលផលយកទៅលក់នៅទីផ្សារ និងប្រើប្រាស់សំរាប់ចំណីអាហារក្នុងគ្រួសារ។
- ការប្រមូលផលរំលោះ គឺគួរចាប់ផ្តើមដំណើរការ បន្ទាប់ពីចិញ្ចឹមបានរយៈពេល ពី២ ទៅ ៣ ខែ ជាបណ្តើរៗ ដោយចាប់រំលោះកូនត្រីទី១១៧៧ ចេញយកទៅផ្សំក្នុងហាប៉ា ឬ ស្រះទុកធ្វើពូជ គឺដើម្បី ឲ្យដងស៊ីតេស្រះមានទំហំទូលាយ សំរាប់ប្រភេទទាំង៣ ឆ្កិន ទីឡាព្យា និងកាសាមញ្ញ/កាបតណ្ហា លូតលាស់បានលឿន។

## ៦.២ ការប្រមូលផលសរុប

ការប្រមូលផល ចាប់ផ្តើមបន្ទាប់ពីបានចិញ្ចឹមរយៈពេល៨ ឡើងទៅ ដែលពេលនោះ ត្រីមានទំហំកាន់តែធំ ជាមធ្យមទំងន់ចាប់ពី ២៥០ក្រាម ទៅ ៣៥០ក្រាម ក្នុងមួយក្បាល អាចយកទៅលក់ក្នុងទីផ្សារបាន និងមានតម្លៃខ្ពស់។ ដើម្បីឲ្យការប្រមូលផល សរុបនេះទទួលបានផលចំណេញច្រើននោះ យើងគួរធ្វើឡើងនៅពេល៖

- ប្រមូលផលត្រីចិញ្ចឹមបានរយៈពេល ពី ៨ ខែឡើងទៅ
- ត្រីទំងន់ចាប់ពី ២៥០ក្រាម ទៅ ៣៥០ក្រាម ក្នុង១ក្បាល
- ប្រមូលផលត្រីនៅរដូវខ្សត់ត្រី ឬរដូវបិទនេសាទ
- ជាពិសេសនៅពេលដែលតម្លៃត្រីនៅទីផ្សារបានថ្លៃ
- លក់ឲ្យអ្នកហូបក្នុងតំបន់ និងខេត្ត ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផល និងពង្រីកការចិញ្ចឹមត្រី

## ៦.៣ បច្ចេកទេសប្រមូលផល

គួរតែដំណើរការនៅពេលព្រឹក លក្ខណៈបិទស្រះស្រះល្អ និងចំពេលតម្លៃទីផ្សារបានថ្លៃ ពេលប្រមូលផលត្រីត្រូវដាក់ដោយឡែកពីគ្នាគឺត្រីធំ និងត្រីតូចដើម្បីងាយស្រួលលក់នៅតាមទីផ្សារ។

- ប្រើអូនអូសក្រឡា១-១.៥សម
- ករណីទឹកនៅជ្រៅអាចបូមទឹកចេញខ្លះដើម្បីងាយស្រួលប្រមូលផល
- ប្រើម៉ាស៊ីនបូមទឹកពង្រឹង រួចចាប់ ដោយត្រៀមសំភារៈសំរាប់ទុកដាក់បោះត្រី
- ប្រមូលផលហើយកសិករ គួរតែស្តារកក់បាតស្រះ និងជួសជុលស្រះឲ្យបានល្អ ទាន់ពេលដីនៅសើមសំរាប់ការដាក់ត្រីចិញ្ចឹមបន្តទៀត ។

**ពារាងតាមដានទំងន់ និង តំលៃទីផ្សារត្រី**



# តម្រូវការបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីបង្កើនផលិតផលព្រៃឈើសម្រាប់ប្រើប្រាស់

តារាងចំណាយ						
ល.រ	ថ្ងៃខែឆ្នាំ	ប្រភេទមុខចំណាយ	ចំនួន	តម្លៃ/ឯកតា	តម្លៃសរុប	ផ្សេងៗ
		បូមទឹកចេញ/ចូលស្រះ				
		ទិញកំបោរ				
		ដី គីមី				
		កូនត្រីពូជ				
		ចំណី				
តារាងចំណូល						
ល.រ	ថ្ងៃខែឆ្នាំ	ប្រភេទមុខចំណូល	ចំនួន	តម្លៃ/ឯកតា	តម្លៃសរុប	ផ្សេងៗ
		លក់កូនត្រីទីឡាព្យា				
		ត្រូវចាប់ហូប				
		ត្រីឱ្យគេ				
		លក់ត្រីសាច់				
		ទុកពូជ				

**ប្រាក់ចំណេញ (ក្នុង១ តម្លៃនៃការវិនិយោគ) = ចំណូលសរុប - ចំណាយសរុប**