



ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានកសិករ



ការចេញផ្សាយរបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា
A Publication of the Cambodian Agricultural Research and Development Institute

សត្វកណ្តុរពេលទុកដាក់ផលិតផល

សត្វកណ្តុរបីប្រភេទសំខាន់ៗ ជាងគេនៅក្នុងការទុកដាក់ មានដូចជា:

- កណ្តុរព្រែងខ្មៅ ឬកណ្តុរព្រែងនៅតាមផ្ទះពិសេសតាមលូទឹក
- កណ្តុរព្រែងកវែង ឬកណ្តុរព្រែងធម្មតា
- កណ្តុរតូចៗឬកណ្តុរបង្កង់នៅតាមផ្ទះ



គេប៉ាន់ប្រមាណថា កណ្តុរព្រែងបំផ្លាញផលិតផលគ្រាប់ធញ្ញជាតិនៅលើពិភពលោកអស់ជាង ១% និងពី ៣-៥ % នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ។ ពួកវាអាចចម្លងជំងឺប្រហែលជា ៥០ ប្រភេទទៅលើមនុស្សរួមមាន ៖ ជំងឺគ្រុនពោះវៀន ជំងឺកមរមាស និងគ្រុនសន្ធឹស្រាល។ ពួកវាក៏ជាភ្នាក់ងារចម្លងជំងឺដ៏ធំមួយដែរ ដែលជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ទៅលើពួកសត្វស្រុក ។

កណ្តុរព្រែងស៊ីអាហារប្រហែលជា ២៥ក្រាម ហើយកណ្តុរតូចៗប្រហែលជា ៣-៤ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃ ។ ពួកវាធ្វើឱ្យប្រឡាក់ផលិតផលដែលរក្សាទុកជាច្រើនដោយសារទឹកនោម លាមក រោម និងភ្នាក់ងារបង្ករោគផ្សេងៗទៀត ។ គំនរដែលពួកវារស់នៅ ជាញឹកញាប់គេប្រកាសថាវាមិនសមរម្យសម្រាប់មនុស្សប្រើប្រាស់នោះទេ ។

វាបំផ្លាញ តង់កៅស៊ូ កាប៉ុង ឈើទម្រ ប្រដាប់បាញ់ទឹក រួមទាំងឃ្នាំងផងដែរ (ខ្សែពួរ ឬខ្សែភ្លើងទ្វារ...)។ ជាញឹកញាប់បណ្តាលឱ្យមានការខូចខាតដូចខាងក្រោមនេះ ៖

- ផលិតផលធ្លាយចេញពីកាប៉ុង ឬសម្ភារៈស្តុកទុក
- គំនរបាវដួលរលំ
- ធ្វើឱ្យចេញផ្កាភ្លើង ឬភ្លើង ពីកន្លែងប៉ះគ្នានៃខ្សែភ្លើង
- ស៊ីឡូ ឬឃ្នាំងស្តុកអាចស្រុតចុះ ឬដួលរលំ ដែលជាលទ្ធផលនៃការទំលាយចោល
- បំផ្លាញប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកជុំវិញឃ្នាំង

សញ្ញាណមួយចំនួនដែលបង្ហាញពីការរុករានរបស់ពួកសត្វកណ្តុរ ៖

• **សត្វរស់ :** ពួកសត្វកកើតគឺសកម្មណាស់នៅពេលយប់ ប្រសិនបើគេឃើញវានៅពេលថ្ងៃ វាជាសញ្ញាមួយនៃដំណាក់កាលរុករានខ្លាំងក្លាទៅហើយ ។

• **លាមក :** រូបរាង ទំហំ និងសភាពលាមកអាចឱ្យដឹងពីប្រភេទនៃសត្វកណ្តុរ និងកម្រិតនៃការរុករានរបស់វា ។ លាមកស្រស់គឺទន់ហើយភ្លឺ ដែល ពី ២-៣ថ្ងៃក្រោយមកប្រែក្លាយទៅជាស្រួយហើយខ្មៅស្រអាប់ ឬប្រផេះ។

• **ការឆ្លងកាត់ និងស្នាម :** ស្នាមនៅតាមជើងជញ្ជាំង របង ឬក៏នៅលើកម្រាលឥដ្ឋ ។ ពួកកណ្តុរប្រែងវាមិនរត់ឆ្លងកាត់ទឹកនៃឡូទ្រុះទេ ។

• **ស្នាមជើង និងកន្ទុយ :** រកមើលស្នាមជើងនិងកន្ទុយនៅលើធ្នូលីដី ។ ម្សៅដែលឃើញរាយប៉ាយជាច្រើនកន្លែងនៅលើកម្រាលអាចជាសញ្ញានៃដានកណ្តុរ ។

ពិនិត្យទៅលើការបំផ្លាញ :

• កណ្តុរប្រែងវាបន្ទុល់ទុកផ្នែកយ៉ាងធំរបស់ដំណាំដោយពួកវាស៊ីច្រើនតិចៗ (ដូចជា ឃើញមានស្នាមកកេរ) តែបើពួកកណ្តុរតូចៗ វិញ ឃើញមានសំណល់សល់តិចតួច ។

- បារដែលវាបំផ្លាញឃើញមានគ្រាប់ដំណាំកំពប់ឬជ្រុះខ្ទាត់ខ្ទាយ
- មានកូនគំនរគ្រាប់តូចនៅខាងក្រោមគំនរបារគ្រាប់
- បំផ្លាញសម្ភារៈនិងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់

ធ្វើរន្ធ ឬសម្បក :

នៅក្នុងឃ្លាំង ដូចជា តាមជ្រុង និងដំបូល ឯខាងក្រៅឃ្លាំង ដូចជា ក្នុងរន្ធ តំបន់ដែលមានដំណាំដុះពេសពេញ ឬក្នុងរណ្តៅជិតៗឃ្លាំងជាដើម ។ ទំហំរន្ធកណ្តុរប្រែងគឺ ៦-៨សង្វីម៉ែត្រ ចំណែកឯកណ្តុរតូចៗគឺ ២ សង្វីម៉ែត្រ ។

ទឹកនោម ស្នាមទឹកនោមគឺទទួលបាននៅក្នុងពន្លឺអុលត្រាវីយូឡេ ។ នៅទីកន្លែងសមស្របយើងអាចប្រើអំពូលអុលត្រាវីយូឡេ ដើម្បីរកមើលស្នាមទឹកនោម ។