



ឆ្នាំទី ២ លេខ ៣៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៥

ការចេញផ្សាយរបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា  
A Publication of the Cambodian Agricultural Research and Development Institute

## ពូជសណ្តែកបាយ "កាឌីជ័យ"

ពូជសណ្តែកបាយកាឌីជ័យ "CARDI Chey" ត្រូវបានបញ្ចេញដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា (កាឌី) នៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទនាឆ្នាំ ២០០១ បន្ទាប់ពីបានធ្វើការពិសោធន៍អស់រយៈពេល ប្រាំមួយរដូវកន្លងមក ។ ពូជនេះមានប្រភពដើមចេញពីស្រឡាយ VC 1973A របស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ដំណាំបន្លែអាស៊ី AVRDCដែលស្ថិតនៅប្រទេសតៃវ៉ាន់។

### លក្ខណៈពិសេសៗរបស់ពូជសណ្តែកបាយ "កាឌីជ័យ"

សណ្តែកបាយ "កាឌីជ័យ" ចេញផ្ការយៈពេល ៣៥ ថ្ងៃ និងទុំប្រមូលផលលើកទីមួយរយៈពេល ៥៥ ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីដាំ។ ដើមដងមានពណ៌បៃតង រាងជ្រុងឈរត្រង់ កម្ពស់ដើមប្រែប្រួលពី ៥០-៧៣ ស.ម បែកមែកពី ២-៤ មែក។ នៅលើដើម និងមែកមានរោមតូចៗ។ ប្រព័ន្ធបូស មានបូសកែវ និងបូសរយាងដែលអាចចាក់ចូលទៅក្នុងដីជម្រៅ ពី ៥០-៦០ ស.ម ប៉ុន្តែ ៨០ ភាគរយ នៃប្រព័ន្ធបូសស្ថិតនៅជម្រៅពី ៥-២០ ស.ម។ នៅលើបូសមានកំពកបូសតូចៗ បង្កើតឡើងដោយវត្តមាននៃបាក់តេរីមួយចំនួនក្នុងពួករីហ្សូប្យូម ដែលមានសមត្ថភាពស្រូប និងភ្ជាប់អាសូត (N) សេរីពី បរិយាកាស និងក្នុងដី។ ទម្រង់ស្លឹកមានលក្ខណៈពិសេសងាយរលួយនៅក្នុងដី ដែលជាប្រភពជីធម្មជាតិដ៏ប្រសើរសម្រាប់ ដំណាំផ្សេងៗទៀត។ ផ្កាជាកញ្ចុំ ពេលរីកមានពណ៌លឿង ផ្លែមានរាងជាស៊ីឡាំងមូលទ្រវែង ផ្លែខ្លីមានពណ៌បៃតងចាស់ និងផ្លែទុំមានពណ៌ខ្មៅ។ គ្រាប់មានពណ៌បៃតង ចំនួនផ្លែក្នុង ១ ដើមពី ១២-២០ ផ្លែ។ ចំនួនគ្រាប់ក្នុងមួយផ្លែពី ៧-១២ គ្រាប់ ទម្ងន់ ១០០០ គ្រាប់ស្មើនឹង ៧៤.៧ ក្រាម និងទិន្នផលជាមធ្យម ០.៦១ តោនក្នុងមួយហិកតា និងមានសក្តានុពលទិន្នផល ១,៩០ តោនក្នុងមួយហិកតា។

### វិធីសាស្ត្រដាំដុះ

ពូជសណ្តែកបាយនេះ អាចដាំដុះបានពេញមួយឆ្នាំនៅតាមតំបន់ខ្ពង់រាបដោយបុកដាំជាជួរ ឬដាំតាមចង្កូរ និងដាំដោយព្រោះគ្រាប់ ទៅលើដីដែលត្រូវរួចហើយរាស់លប់។ ចំពោះការដាំដោយបុករណ្តៅជាជួរគួរប្រើ គម្លាតគុម្ព ២៥-៣០ ស.ម គុណនឹង ៣៥-៤០ ស.ម និងជម្រៅពី ២-៣ ស.ម ដោយក្នុងមួយរណ្តៅដាក់គ្រាប់ចំនួន ២-៣ គ្រាប់។ រីឯការដាំតាម តំបន់ទំនាបគឺដាំបន្ទាប់ពីច្រូតស្រូវរស្សាវូច ត្រូវលើករងចម្ងាយពីគ្នាប្រហែល ៣០ ស.ម និងមានកម្ពស់ ១០ ទៅ ១៥ ស.ម។ ការដាំដុះពូជសណ្តែកបាយលើផ្ទៃដីមួយហិកតា គឺបើដាំដោយបុកដាំជាជួរត្រូវការគ្រាប់ពូជពី ១៥-២០ គ.ក្រ/ហា.ត និងបើដាំដោយ ព្រោះត្រូវការគ្រាប់ពូជពី ៣០-៤០ គ.ក្រ/ហា.ត។



ក្រោយពីដាំបាន ១០-១៥ ថ្ងៃ គួរកាត់ រំលោះកូនដោយទុក តែដើមណាដែលឆ្កោស និងរឹងមាំល្អជាងគេចំនួន ១-២ ដើម ក្នុងមួយគុម្ពចៀសវាងការដណ្តើមដីជាតិពីដំណាំដែលនាំឲ្យដំណាំលូតលាស់យឺត។ ត្រូវដកស្មៅចង្រៃឲ្យបានស្អាត ចៀស វាងការដណ្តើមដីជាតិពីដំណាំដែលនាំឲ្យដំណាំដុះលូតលាស់យឺត។

**ការដុះលូតលាស់**

ការធ្វើដីបានផុសល្អ ដីមានដីជាតិសំណើមគ្រប់គ្រាន់ និងធាតុអាកាសអំណោយផល ក្រោយពីដាំបាន ៣ ថ្ងៃ គ្រាប់ចាប់ ផ្តើមដុះទូលដីមកខាងលើ។ ចាប់ពីពេលដុះពន្លករហូតដល់អាយុ ១៥ ថ្ងៃសណ្តែកមានការដុះលូតលាស់ពុំសូវលឿន ប៉ុន្មានទេតែអាយុកាលចាប់ពី ២០ ថ្ងៃឡើងទៅ សណ្តែក បាយមានការដុះលូតលាស់យ៉ាងលឿន។

ឈ្មោះដី	កម្រិតដីទៅតាមក្រុមដី (គ.ក្រ / ហ.ត)		
	ព្រៃខ្មែរ ប្រទះឡាង (ដីខ្សាច់-ល្អាយខ្សាច់)	កំពង់សៀម ឡាបានសៀក ទូលសំរោង (ដីល្អាយសង្ក)	កៀនស្វាយ (ដីល្អាយ)
ដេអាប៉េ	១០០	១១០	៨៥
ប៉ូតាស្យូម	៥០	៥០	៥៥

**ការប្រើប្រាស់ដី**

ការប្រើប្រាស់ដីតាមបច្ចេកទេស និងត្រឹមត្រូវតាមពេល វេលាធ្វើឲ្យដំណាំដុះលូតលាស់ល្អទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់។ ដីដែលអាចប្រើប្រាស់គឺដី ដេអាប៉េ និងប៉ូតាស្យូម។ ការប្រើប្រាស់ដី គឺដីដេអាប៉េ និងប៉ូតាស្យូម (១០០ ភាគរយ) ដាក់ ទ្រាប់បាតមុនពេលដាំ ១ ទៅ ២ ថ្ងៃ។ ដីត្រូវដាក់ដោយគួរលុបក្នុងជម្រៅ ៥-១០ ស.ម ការពារដីមិនឲ្យបាត់បង់ តាមរយៈ ការហើរទៅក្នុងបរិយាកាស និងការហូរច្រោះដោយសារទឹកផង។ ចំពោះដីលាមកគោ ឬកំប៉ុស្តិ៍ កសិករ អាចប្រើ នៅពេល ទ្រាប់បាតក្នុងកម្រិត ៥ គ/ហ.ត ឬ ០,៥ គ.ក្រ/ម<sup>២</sup> បន្ថែមលើដីគីមី បើសិនជាដី របស់គាត់ខ្វះ សារធាតុសរីរាង្គ។

**ការប្រមូលផល**

ផ្លែសណ្តែកទុំអាចប្រមូលផលនៅរយៈពេល ២០ ថ្ងៃក្រោយចេញផ្កា (ចំនួនផ្លែលើសពី ៩០ ភាគរយ ចាប់ផ្តើមប្រែពណ៌ពី បៃតងក្រមៅទៅជាខ្មៅ)។ គេអាចប្រមូលផលបាន ២-៣ លើក ក្នុងមួយវដ្តជីវិតរបស់វា។ គម្លាតពេលប្រមូលផលពីមួយ លើកទៅមួយលើកមានរយៈពេល ៥-៧ថ្ងៃ។ ប៉ុន្តែការប្រមូលផលលើកទីបី ពុំសូវទទួលបានទិន្នផលច្រើនដូចលើកទីមួយ និងទីពីរទេ។ ការយឺតយ៉ាវក្នុងការប្រមូលផល ជាហេតុធ្វើឲ្យទិន្នផលមានការបាត់បង់ដោយសារផ្លែទុំប្រេះនាំឲ្យជ្រុះគ្រាប់ នៅរដូវប្រាំង ឬគ្រាប់សណ្តែកអាចដុះនៅក្នុងផ្លែបើមានភ្លៀងធ្លាក់ជាប់យូរថ្ងៃនៅរដូវវស្សា។

**ការទុកដាក់ក្រោយប្រមូលផល**

ជាមធ្យមសំណើមគ្រាប់ក្រោយពេលប្រមូលផលពី ១៥-១៨ ភាគរយ ដូច្នេះតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការហាលសម្ងាត់បន្ថែមទៀត ដោយកម្ដៅថ្ងៃ។ ការយឺតយ៉ាវក្នុងការហាលសម្ងាត់ក្រោយពេលប្រមូលផល និងការទុកដាក់គ្រាប់មិនបានត្រឹមត្រូវ គឺងាយ រងការបំផ្លាញពីពពួកសត្វល្អិតចង្រៃ ដូចជាខ្នុតជាដើម ដោយវាស៊ីចោះផ្នែកខាងក្នុងរបស់គ្រាប់ដែលធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ ទាំងទិន្នផលគុណភាព និងតម្លៃ។

**ការរក្សាទុកគ្រាប់ពូជ**

ពូជសណ្តែកបាយនេះ ជាពូជដែលមានស្ថេរភាពសេនេទិច និង អាចរក្សាទុកគ្រាប់ពូជដាំបានទៀតពី ២-៣ រដូវកាល ប្រសិនបើ យើងធ្វើការបន្តពូជបានត្រឹមត្រូវ។ ការរក្សាទុកគ្រាប់ពូជ សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅរដូវបន្ទាប់ គឺគ្រាប់ពូជត្រូវមានសំណើមពី ១២-១៣ ភាគរយ ហើយត្រូវរក្សាទុកនៅកន្លែងដែលគ្មានសត្វ ល្អិត គ្មានខ្យល់ចេញចូល ឬទុកនៅក្នុងធុងបិទជិត ឬអាចរក្សា ទុកដោយប្រើប្រាស់ថ្នាំការពារសត្វល្អិត។



សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមធ្វើការទាក់ទង ការិយាល័យក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យា មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល និងព័ត៌មាន ការិយាល័យផែនការ សហប្រតិបត្តិការ និងពាណិជ្ជកម្ម នៃវិទ្យាស្ថាន ស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា នៅតាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ ៣ សង្កាត់ប្រទះឡាង ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមប្រអប់សំបុត្រលេខ ០១ ភ្នំពេញ  
 ទូរស័ព្ទលេខ: (៨៥៥-២៣) ៦៣១៩ ៦៩៣-៨  
 ទូរអគ្គី: PBREED@cardi.org.kh  
 គេហទំព័រ: [www.cardi.org.kh](http://www.cardi.org.kh)  
[trin@cardi.org.kh](mailto:trin@cardi.org.kh)  
[hunyadana@cardi.org.kh](mailto:hunyadana@cardi.org.kh)