

ជំងឺសាទឹកគោ - ក្របី



រៀបរៀងដោយ : នាយកដ្ឋានផលិតកម្ម និងបសុព្យាបាល

ជំងឺសាទឹកគោ ?

ជំងឺសាទឹកគោជាជំងឺឆ្លងដ៏សាហាវមួយក្នុងចំណោមជំងឺឆ្លងនានា។ បង្កឡើងដោយបាក់តេរីប៉ាស្ទ័ររ៉េលឡាម៉ូលតូស៊ីដា (PasteurellaMultocida) ។ បាក់តេរីនេះមានរាងជាកូនដំបងខ្លីគ្មានចលនានិងគ្មានស្ល័រ។ ជំងឺសាទឹកគោកើតលើសត្វគ្រប់ប្រភេទដូចជា សត្វគោ-ក្របី ច្រៀម ពពែ ជ្រូក។ល។ បណ្តាលឱ្យមានការរលាក និងជាំឈាមនៅតាមសរីរាង្គខាង

ក្នុង របស់សត្វ ជាពិសេសប្រដាប់ដកដង្ហើម និងប្រដាប់វិលាយអាហារ ជំងឺនេះកើតឡើងរៀងរាល់ឆ្នាំ ហើយច្រើនកើត ឡើងនៅរដូវភ្លៀង ធ្លាក់ បណ្តាលឱ្យគោ-ក្របីងាប់យ៉ាង ឆាប់រហ័ស ។

តើជំងឺសាទឹកគោរាងដាច់ដោយរបៀបណា ?

ជំងឺសាទឹកគោ-ក្របី ឆ្លងពីសត្វមួយទៅសត្វមួយទៀត តាមរយៈការប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយសត្វឈឺ ឬភ្នាក់ងារផ្ទុកជំងឺ ការស៊ី ស្មៅ ឬ រុក្ខជាតិនៅកន្លែងដែលមានការផ្ទុះជំងឺ និង មិន ផ្ទាល់ (ពពួក ប៉ារ៉ាស៊ីត) ។ ចំពោះសត្វក្មេងអាចទទួលជំងឺនេះ យ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ជាទូទៅជំងឺនេះអាចរាតត្បាត និងកើតឡើងជាញឹកញាប់នៅពេល អាកាសធាតុប្រែប្រួល ជាពិសេស ក្នុងរដូវភ្លៀងធ្លាក់ ។

ជាញឹកញាប់គេពិនិត្យឃើញសត្វឆ្លងជំងឺតាមរយៈ

- ការស៊ីចំណី ឬ ផឹកទឹកជាមួយសត្វដែលឈឺ
- សាកសពនៃសត្វដែលងាប់ដោយជំងឺសាទឹកគោគឺជាប្រភព នៃការចម្លងជំងឺ
- ដីដែលនៅជុំវិញកន្លែងធ្វើការវះកាត់សាកសពនោះក្លាយ ទៅជា កន្លែងចម្លងមេរោគ ។

រោគសញ្ញា:

- រយៈពេលមេរោគសំងំមានពី ២-៥ ថ្ងៃ
- សត្វមានអាការៈគ្រុនក្តៅសីតុណ្ហភាពឡើងខ្ពស់កម្លាំង ចុះខ្សោយ សត្វចុះស្នមយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងមានជាំឈាម នៅតាម ស្រទាប់ភ្នាសស្តើងនៃសរីរាង្គខាងក្នុង។ ជាទូទៅយើងពិនិត្យឃើញគោ ក្របីមានហើមនៅជុំវិញ ក ហើយរាលដាល ដល់ស្នាមខុកនៃស្រទាប់ ឡើងក្តៅ មានសភាពទន់ជ្រាយ អណ្តាតអាចហើម និង ធ្លាក់ចេញ



ការហើមមុខ ក្បាល និង ក ដោយសារការរលាកស្រទាប់ភ្នាស សរីរាង្គខាងក្នុង

មកក្រៅ ភ្នែកឡើងហើម និងរលាកនៅតាមស្រទាប់ភ្នាសស្តើង គ្របកភ្នែកក្នុង។ សត្វ ហើមពោះ រាគណាមណាយជាមួយវិអិល សំបោរ រលាកស្នូត ជីពចរ និងដង្ហើមដើរញាប់។

-សត្វអាចងាប់ក្នុងរយៈពេល ៦-២៤ម៉ោង



ស្នាមជាំឈាមស្រទាប់ភ្នាសសាច់ខាងក្នុងមាត់



ស្នាមជាំឈាមស្រទាប់ភ្នាសសាច់ខាងក្នុងនៃ ក

- ស្នាមជាំឈាមស្រទាប់ភ្នាសសាច់ខាងក្នុងនៃ ក


វិធានការការពារ:

- ត្រូវប្រញាប់រាយការណ៍ជូនមន្ត្រីបន្តពេទ្យឬភ្នាក់ងារសុខភាពសត្វភូមិដែលនៅជិតអ្នកបំផុតនៅពេលមានឆ្លងជំងឺសាទិក
- ត្រូវបំបែកសត្វឈឺចេញពីហ្វូង
- ត្រូវធ្វើអនាម័យកន្លែងចិញ្ចឹមជាប្រចាំ
- ជៀសវាងការផ្តល់ចំណី ឬរុក្ខជាតិមានប្រភពពីកន្លែងផ្ទះ ឬឆ្លងជំងឺ
- ហាមចលនាសត្វចេញ-ចូល ឬ ឆ្លងកាត់តំបន់ផ្ទះជំងឺ

- ហាមបិទពាល់សត្វងាប់ និងពិឃាតសត្វឈឺ ឬសត្វដែលសង្ស័យ ថាឈឺយកសាច់សក់ ឬបរិភោគ

វិធានការដែលមានប្រសិទ្ធិភាពបំផុត ក្នុងការការពារ កុំ ឱ្យគោ ក្របីកើតជំងឺសាទិកគឺចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ។ ការចាក់វ៉ាក់សាំង ដល់សត្វជាមុនអាចការពារមិនឱ្យសត្វឆ្លងជំងឺទោះបីជាវាស្ថិតនៅ ក្នុងហ្វូងសត្វឈឺក៏ដោយ។

ការចាក់វ៉ាក់សាំងត្រូវធ្វើឱ្យបានទៀងទាត់តាមប្រតិទិនចាក់ ថ្នាំការពារ វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺសាទិកផ្តល់ភាពស៊ាំ បានរយៈពេល ៦ ខែ ចំពោះថ្នាំប្រភេទអារី និង ១២ ខែចំពោះថ្នាំ ប្រភេទខាប់។ ថ្នាំការពារសត្វសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងជំងឺសាទិកគោ-ក្របី



ថ្នាំការពារសត្វសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងជំងឺសាទិកគោ-ក្របី

ការការពារប្រសិនបើមានការព្យាបាល