



ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានកសិករ



ការចេញផ្សាយរបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា
A Publication of the Cambodian Agricultural Research and Development Institute

ដង្កូវស្បែងដើមស្រូវ

I. សេចក្តីផ្តើម

ដង្កូវស្បែងដើមមានច្រើនប្រភេទនៅប្រទេសកម្ពុជាដូចជា ដង្កូវស្បែងដើមពណ៌លឿង ដង្កូវស្បែងដើមពណ៌ស៊ីជម្ពូ ដង្កូវស្បែងដើមឆ្នូត និងដង្កូវស្បែងដើមក្បាលខ្មៅ ។ ប៉ុន្តែគេប្រទះឃើញភាគច្រើន នៅក្នុងប្រទេសយើង គឺពួកដង្កូវស្បែងដើមពណ៌លឿង ដង្កូវស្បែងដើមក្បាលខ្មៅ និងដង្កូវស្បែងដើមឆ្នូត ។

មេអំបៅដង្កូវស្បែងដើម ពេលថ្ងៃលាក់ខ្លួននៅក្នុងស្មៅជិតស្រែ ឬក្នុងស្រូវ ។ ពេលយប់វាធ្វើសកម្មភាពរកស៊ី និងដោយញីឈ្មោល ហើយវាចូលចិត្តពន្លឺភ្លើង ។ វាអាចហើរបានឆ្ងាយ ជាធម្មតារហូតដល់២គម ហើយមេមួយអាចពងបានប្រហែល ២០០ ទៅ ៣០០ ពង ក្នុងរយៈពេល ៤ថ្ងៃ ។

II. លក្ខណៈរូបរាង

មេអំបៅដង្កូវស្បែងដើមពណ៌លឿងមេមានទំហំធំជាងឈ្មោល ដែលឈ្មោលមានពណ៌ត្នោតខ្ចី មានចំណុចខ្មៅតូចនៅលើស្លាបម្ខាងមួយ និងមានស្នាមអុចឆ្នូតៗចំនួន ៥ នៅគល់ស្លាប និង៨ ទៅ៩ នៅខាងចុងស្លាប ។ ចំណែកមេអំបៅញីមានពណ៌ចំបើង និងមានចំណុចខ្មៅចំណាត់ស្លាបម្ខាងមួយ ។

មេអំបៅដង្កូវស្បែងដើមក្បាលខ្មៅ និងឆ្នូតមានភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ដោយមានពណ៌ចំបើងទៅត្នោតស្រាល និងមានចំណុចពណ៌ប្រាក់នៅលើផ្ទៃស្លាប និងចំណុចខ្មៅតូចៗនៅខាងចុងស្លាប ។



ពងវាមានពណ៌លឿងភ្លឺរលោងនៅរាយប៉ាយ ឬផ្គុំគ្នាជាសំបុកពី២០០ ទៅ ៣០០ នៅផ្នែកខាងលើផ្ទៃស្លឹក និងនៅស្រទាប់ស្លឹកស្រូវ ទៅតាមប្រភេទរបស់វា ។

ដង្កូវស្បែងដើមពណ៌លឿងមានពណ៌លឿង ក្បាលវាពណ៌ទឹកក្រូច និងចូលស៊ីតែមួយក្នុងមួយដើម ។ ដង្កូវស្បែងដើមឆ្នូតមានឆ្នូត៥តាមបណ្តោយដងខ្លួន ក្បាលវាពណ៌ត្នោត ។ ដង្កូវស្បែងដើមក្បាលខ្មៅមានឆ្នូត៥តាម បណ្តោយដងខ្លួន ក្បាលវាពណ៌ខ្មៅ ។ ដង្កូវស្បែងដើមឆ្នូត និងក្បាលខ្មៅ ចូលស៊ីក្នុងមួយដើមពី២-៥ ដង្កូវ ។ ដង្កូវញាស់ថ្មីៗផ្លាស់ទីទៅកាន់ដើមឬគុម្ពផ្សេងទៀត តាមរយៈសរសៃសូត្ររបស់វា ។ នៅពេលដង្កូវនៅតូច វាស៊ីនៅត្រង់ចន្លោះដើម និងស្រទាប់ស្លឹក ក្នុងរយៈពេល ២-៣ថ្ងៃមុនពេលវាចូលទៅក្នុងដើម ។ ដង្កូវចំណាស់ស៊ីនៅក្នុងដើមនៅជិតគល់ ហើយវាអាចស្បែងចូលទៅក្រោមផ្ទៃដី នៅពេលដែលវាជិតក្លាយជាដឹកខ្សឿ ឬលក្ខខណ្ឌមិនសមស្របសម្រាប់វា ។

ដង្កូវក្លាយជាដឹកខ្សឿក្នុងដើមស្រូវនៅជិតគល់ ឬក្រោមផ្ទៃដី២-៣ សម។ មេអំបៅញាស់ពីសំបុកដឹកខ្សឿ រួចហើរចេញពីក្នុងដើមស្រូវតាមរន្ធដែលបានចោះទុក កាលវានៅជាដង្កូវ ។

II. ការស៊ីបំផ្លាញ

វាស៊ីបំផ្លាញស្រូវ ដោយដង្កូវវាស្បែងនៅក្នុងដើមស្រូវ ដែលអាចកាត់ផ្តាច់ចលនារបស់ទឹក និងដីជាតិ ។ វាបំផ្លាញស្រូវចាប់ពីដំណាក់កាលសំណាបរហូតដល់ស្រូវចេញផ្កា ។ ស្រូវស្ងួតបណ្តាល នៅពេលដែលវាបំផ្លាញមុនពេលកកើតកូរ បណ្តាលដែលខូចខាតដោយសារដង្កូវស្បែងដើម(ងាប់បណ្តាល) ងាយក្នុងការដកហូតចេញពីដើម ។ ជួនកាលនៅផ្នែកត្រង់គល់នៃស្លឹកដែលដកចេញមក គេសង្កេតឃើញមានកំទេចកំទី និងអាចម៍ដង្កូវ។ នៅពេលដែលវាបំផ្លាញក្រោយពេលកកើតកូរ គេសង្កេតឃើញកូរស ដែលបង្ហាញថាកូរស្រូវស្តុកខូច។



II. វិធានការការពារ និងកម្ចាត់

គេអាចការពារ និងកំចាត់វាដោយ :

- សំអាតស្មៅជុំវិញស្រែ
- កូរស្រែបន្ទាប់ពីប្រមូលផល
- ដាំដុះឲ្យស្របពេលគ្នា
- កុំប្រើដីអាសូតច្រើនពេក ត្រូវប្រើឲ្យបានច្រើនដង
- ប្រើពូជធន់
- ប្រមូលសំបុកពងយកមកកម្ទេចចោល
- ថែរក្សាការពារសត្វមានប្រយោជន៍ ។