

ដំណាំស្ពៃផ្កា

ការរៀបចំដីដាំ

- រៀបចំរងទំហំ៨០ សង់ទីម៉ែត្រ (ត្រូវមានកំពស់ ៣០ សង់ទីម៉ែត្រយ៉ាងតិចនៅរដូវវស្សា)
- ពង្រាយជីលាមកគោស្ងួតវីជីកំប៉ុស្តិ៍ និងជីកែងៗពេញរងហើយកាប់ប្រចល់ជាមួយដីអោយសព្វល្អ
- គ្របរងដោយ ចំបើងអោយបានកំរាស់យ៉ាងតិច៥សង់ទីម៉ែត្រ រឺប្រើគំរូបដីផ្លាស់ស្លឹក ដើម្បីការពារស្មៅចង្រៃ និងរក្សាសំណើមដី

ការបណ្តុះកូន

- ដើម្បីអោយបានកូនស្ពៃផ្កាដែលមានសុខភាពល្អ យើងត្រូវបណ្តុះកូនតាមរបៀបខាងក្រោម៖
- រៀបចំកន្លែងបណ្តុះ (ស្លឹកត្នោត រឺស្លឹកចេក) រឺ ថាសបណ្តុះ
 - យកដីមានជីជាតិ (ដីដំបូក) ១ភាគ ជីកំប៉ុស្តិ៍ រឺ ជីលាមកគោដែលរលួយ ១ភាគ និងផេះអង្កាម ១ ភាគ លាយជាមួយគ្នាហើយ យកទៅលឹងអោយក្តៅបំផុត រួចទុកអោយត្រជាក់ទើបដាក់កន្លែង ។ បើមិនលឹងល្បាយដីទេ កូនដំណាំងាយមានជំងឺផ្សិត ធ្វើឱ្យ លួយបាន ។
 - បណ្តុះតែ១គ្រាប់ក្នុងមួយកន្លែង ត្រូវគ្របសំណាញ់សត្វល្អិត និងធ្វើដំបូលគ្របអំពីស្លឹកដូង រឺ សំណាញ់កាត់ពន្លឺនៅរដូវក្តៅ ។ រដូវវស្សាត្រូវធ្វើដំបូលការពារទឹកភ្លៀង ពីព្រោះកូនដំណាំនៅតូចមិនត្រូវការពន្លឺ និងទឹកច្រើនទេ ។
 - ស្រោចទឹក១ថ្ងៃមួយដងនៅពេលព្រឹក (បើទុកដីបណ្តុះស្ងួត គ្រាប់មិនអាចដុះបានទេ បើកូនដុះហើយក៏នៅក្រិនដែរ)

កូនដំណាំមានសុខភាពល្អ ជួយអោយដំណាំធំលឿន កាត់បន្ថយការបំផ្លាញពីជំងឺ សត្វល្អិត និងទទួលបានផលបានស្មើគ្នា

ការដាំកូនស្ពៃផ្កា

- ត្រូវដាក់កូនស្ពៃផ្កាអោយត្រូវចំពន្លឺថ្ងៃបានចំនួន ២-៣ថ្ងៃមុនដាំ ដើម្បីអោយកូនរឹងមាំល្អហើយផ្សាំ និងអាកាសធាតុខាងក្រៅ បាន ។
- កូនស្ពៃផ្កាអាយុបាន ១៨-២២ថ្ងៃ អាចយកទៅដាំបាន (តែអាស្រ័យតាមការថែទាំកូន)
- ស្រោចទឹកកូនស្ពៃផ្កាអោយសើមល្អនៅពេលព្រឹក ហើយចាប់ផ្តើមដាំនៅពេលរសៀល
- យកកូនចេញពីកន្លែង រឺថាសបណ្តុះដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតមិនត្រូវអោយដាច់ឬសកូនស្ពៃផ្កាឡើយ ព្រោះវាធ្វើអោយកូនស្ពៃ ផ្កាអន់បាននៅពេលដាំ ។
- ត្រូវស្រោចទឹកកូនស្ពៃផ្កាអោយបានគ្រប់គ្រាន់បន្ទាប់ពីដាំហើយ ជាពិសេសរវាងពី ២-៣ អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំកូនហើយ

ការថែទាំ

- ត្រូវស្រោចទឹកអោយបានគ្រប់គ្រាន់នៅពេលព្រឹក ជៀសវាងស្រោចទឹកច្រើនពេកធ្វើអោយដីសើមជ្រុលនៅពេលថ្ងៃល្ងាច វា អាចបង្កអោយមានបញ្ហាដល់ ដំណាំបាន ។
- ពេលផ្កាបានទំហំពី ៤ ស.ម យើងចាប់ផ្តើមអមផ្តាត់រកគ្នាខ្ចាស់អោយជាប់ដើម្បីបាំងពន្លឺ និង កំដៅថ្ងៃរហូតដល់ផ្កាវិកលម្តង កាត់ ។
- បេះស្លឹកនៅផ្នែកខាងក្រោមចោល (ស្លឹកទុំ)



ការធ្វើប្រតិបត្តិ (បើដាក់ដីត្រូវស្រោចទឹក ទើបដំណាំអាចចាប់យកជីបាន)

ពេលវេលា	ប្រភេទដីប្រើ	កន្លែងដែលត្រូវដាក់ជី
ទ្រាប់បាត	ជី អិន ប៉េ ក (១៥. ១៥. ១៥)៣០ក្រាម (៣ស្លាបព្រាបាយស្លើ)/ម៉ែត្រការ៉េ ជីលាមកសត្វ ១.៥ គីឡូក្រាម/ម៉ែត្រការ៉េ	ពង្រាយលើរងហើយកាប់ប្របល់និងដី
ការដាំកូន	១ដើម/រណ្តៅ (កូនស្ពៃអាយុ ១៨-២២ថ្ងៃចាប់ផ្តើមដាំ)	
១ អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំ	ជីអ៊ុយរ៉េ ២.៥ ក្រាម (១ចុងស្លាបព្រាបាយ)/ដើម	កប់ជីរាក់ៗ ចំងាយពីគល់កន្លះតឹក
២អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំ	ជី អិន ប៉េ ក (១៥. ១៥. ១៥) ៧.៥ ក្រាម (១ស្លាបព្រាបាយស្លើ)/ដើម	កប់ជីរាក់ៗ ចំងាយពីគល់១តឹក
៣ អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំ	ជី អិន ប៉េ ក (១៥. ១៥. ១៥) ៣.៧៥ ក្រាម (១ចុងស្លាបព្រាបាយ)/ដើម ជីប្តូរស្រូវ ២ក្រាម (១ចុងស្លាប ព្រាបាយ)/ដើម	កប់ជីរាក់ៗ ចំងាយពីគល់ ១តឹកកន្លះ
៤ អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំ	ជី អិន ប៉េ ក (១៥. ១៥. ១៥)៣.៧៥ ក្រាម (១ចុងស្លាបព្រាបាយ)/ដើម	កប់ជីរាក់ៗ ចំងាយពីគល់ ១តឹកកន្លះ

ខ័ណ្ឌនិងសត្វល្អិត

- សូមឧប្បាហ៍ពិនិត្យរកមើលពងដង្កូវ និងកូនដង្កូវនៅខាងក្រោមស្លឹក ហើយពេញវាសំបុកដង្កូវចោល ។
- បើទុកដង្កូវនេះអោយធំ នោះពិបាក និង កំចាត់វាណាស់ ទោះបាញ់ថ្នាំពុលក៏ពិបាកសំលាប់វាដែរ ហើយដង្កូវវាងាយលាក់ខ្លួនក្នុងដី ។
- សូមដកដើមស្ពៃផ្កាចេញភ្លាមបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ប្រមូលផលហើយ ។ កុំទុកដើមដែលឈប់ប្រមូលផលហើយនៅនឹងក្នុងចំការ ។ ពីព្រោះវាជាជំរកសត្វល្អិតនិងជំងឺបំផ្លាញទៅដំណាំផ្សេងទៀតបាន ។

ប្រការចងចាំ

- កុំប្រើថ្នាំឈ្មោះកំចាត់សត្វល្អិតនិងជំងឺដីដែលៗ វាធ្វើអោយសត្វល្អិតនិងជំងឺឆន់ទ្រាំជាមួយថ្នាំ ពិបាកកំចាត់នៅ ពេលក្រោយ ។
- កុំប្រើថ្នាំពុលលាយចូលគ្នានៅពេលបាញ់ វាធ្វើអោយថ្នាំគ្មានប្រសិទ្ធិភាព ហើយសត្វល្អិត ដង្កូវរហ័សសាំនិងថ្នាំ ពិបាកកំចាត់វាពេលក្រោយ ។ ជាពិសេសកុំប្រើថ្នាំដែលមានវណ្ណពណ៌ក្រហម (សញ្ញាក្បាលខ្មោច) វាគ្រោះថ្នាក់ ដល់សុខភាពខ្លាំងណាស់ ។
- កុំបាញ់នៅពេលមេឃជិតធ្លាក់ភ្លៀង មានខ្យល់ និងនៅពេលថ្ងៃត្រង់ ។
- សូមកុំដាំពូកអំបូរស្ពៃលើដីដដែល វាបង្កអោយមានជំងឺ និងសត្វកើតឡើងច្រើនពិបាកកំចាត់វាណាស់ ។

ការប្រមូលផល

- កាត់ផ្កាស្ពៃពេលព្រឹក ដោយរក្សាទុកស្លឹកអមផ្កា៤ ទៅ ៥ និងត្រូវទុកផ្កាដែលកាត់ហើយក្នុងម្លប់ ។

