

# ដំណាំត្រប់

## ១. ការបណ្តុះកូន

រៀបចំដីដាក់កន្លោងស្លឹក រឺ ថាសបណ្តុះកូន



១កន្លោងដាក់១គ្រាប់ រឺ ១ប្រលោះថាសបណ្តុះ១គ្រាប់



- ធ្វើដំបូលគ្របពិស្លឹកដូង រឺ សំណាញ់កាត់ពន្លឺ
- រើដំបូលចេញ ៣ថ្ងៃមុនដាំដើម្បីអោយកូនរឹងមាំល្អ
- គ្របចំប្រើងពិលើថាសបណ្តុះកូន រឺ កន្លោងស្លឹក
- បន្ទាប់ពីសាបគ្រាប់ ២-៣ថ្ងៃយើងអាចដកចំប្រើងចេញ
- ដករលោះកូនបន្ទាប់ពីកូនដុះបាន៧ថ្ងៃគឺ១កន្លោង ទុកតែ១ដើមប៉ុណ្ណោះ ។



## ២. ការរៀបចំដី


- ភ្ជួរ ២-៣ដង ក្នុងជំរៅពី ២៥-៣០ ស.ម ហើយរាស់បំបែកដីអោយរាបស្មើរួចហាលដីអោយស្ងួត ។

## ៣. ការលើករង

- បណ្តោយរង: មិនត្រូវបានកំណត់ទេ អាស្រ័យទៅតាមលទ្ធភាពផ្ទៃដីដែលមាន
- ទទឹងរង: មិនត្រូវលើសពី ១ -១,២ម ឡើយ
- ចន្លោះរង: ចន្លោះពីររងមួយទៅរងមួយពី ០,៥ ម
- កំពស់រង:
  - o រដូវប្រាំង: កំពស់ ២០ ស.ម ដោយមានកំពែង ដើម្បីកុំអោយទឹកហូរចេញ
  - o រដូវវស្សា: កំពស់ ៣០ស.ម រាងជាខ្នងអណ្តើក ។ ចន្លោះពីររងមួយទៅរងមួយមានចង្កូរទឹក

**៤. ការដាំកូន**

- គ្របបរងដោយ ចំប៉ែង (កំរាស់យ៉ាងតិច៥សង់ទីម៉ែត្រ) វិជ្ជាស័ស្តិកគ្របបរង ដើម្បីការពារស្មៅចង្រៃ និងរក្សាសំណើមដី
- មុនដកកូនទៅដាំត្រូវបន្ថយការស្រោចទឹក (ស្រោចមិនជាកពេក) ២-៣ថ្ងៃ ដើម្បីអោយកូនមានភាពរឹងមាំ
- មុនយកកូនទៅដាំប្រមាណ៣ថ្ងៃត្រូវបន្ថយការស្រោចទឹក (ស្រោចមិនអោយជោកពេក) ដើម្បីអោយដើមរឹងមាំតែមុនដកដាំត្រូវស្រោចទឹកអោយជោកសិននៅពេលព្រឹក ហើយដាំនៅពេលរសៀល ។
- កូនអាយុ ២០-២៥ ថ្ងៃ ឬ កូនមានសន្លឹកពី ៤-៥ អាចដាំបាន
- ចន្លោះជួរ ៦០ស.ម និង ចន្លោះគុម្ព ៥០ស.ម និង ដាំ១ រណ្តៅ តែ ១ដើម (សូមមើលរូប)



**៥. ការប្រើប្រាស់ដី**


សំរាប់ពូជបន្លែទំនើបមានការប្រើប្រាស់ដីគីមី និងដីធម្មជាតិច្រើនបើធៀប និង ពូជបន្លែក្នុងស្រុក ។ ដីដែលបានដាក់មានប្រសិទ្ធិភាពពេលណាយើងស្រោចទឹកបានគ្រប់គ្រាន់ ។ ទឹកមានតួនាទីជាអ្នកនាំដីដែលបានដាក់អោយទៅដល់ឫសដំណាំ ហើយធ្វើអោយដំណាំលូតលាស់បានល្អ ។

**របៀបដាក់ដីទ្រាប់បាត:**

- ប្រភេទទី១ យើងត្រូវយកដីគីមី និងដីលាមកសត្វមកពង្រាយលើរង ទើបកាប់ច្របល់ដីទាំងនេះជាមួយដីសើម ទើបយើងធ្វើរណ្តៅដាក់ដាំកូន ។
- ប្រភេទទី២ យើងអាចដាក់ដីនៅក្នុងរណ្តៅ ហើយលាយច្របល់ជាមួយដីបន្ទាប់មកទើបដាំកូនចំងាយប្រមាណ ៥ ស.ម ពីដីដែលច្របល់នោះ ។
- **របៀបដាក់ដីបំប៉ន:** យើងត្រូវជីកកប់ដីដែលត្រូវដាក់នៅសងខាងរណ្តៅ រីនៅចន្លោះគុម្ព ។ មិនត្រូវដាក់ដីជាប់នឹងគល់បន្លែទេ របៀបដាក់ដីដូចជា:
  - ២ អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំ ត្រូវដាក់ដី ចំងាយប្រមាណ ៥ស.ម ពីគល់បន្លែ
  - ៤ -៥ អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំ ត្រូវដាក់ដី ចំងាយប្រមាណ ១០ស.ម ពីគល់បន្លែ
  - លើសពី៥អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំត្រូវដាក់ដី ចំងាយប្រមាណ១៥ស.ម ពីគល់បន្លែ

**របៀបដាក់ដីបំប៉ន**

កន្លែងដាក់ដីបំប៉នអាស្រ័យទៅតាមអាយុកាលដំណាំ ។  
យើងត្រូវឆ្លុះ រឺ បុករណ្តៅដាក់ដីហើយចូកដីលុបរិញ



**- បរិមាណដីដែលត្រូវដាក់**

ដាក់ដីទ្រាប់បាត	ដី កែង ១៣ក្រាម (១ស្លាបព្រាបាយ)/ដើម ជីលាមកសត្វ ០.៥គីឡូក្រាម/ដើម
ការដាំកូន	
១ អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំ	
២ អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំ	ជីអ៊ុយរ៉េ ២.៥ ក្រាម (១ចុងស្លាបព្រាបាយ)/ដើម
៣ អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំ	
៤ អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំ	ដី កែង ២.៥ ក្រាម (១ចុងស្លាបព្រាបាយ)/ដើម
៥ អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំ	
៦ អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំ	ជី ប៉ូតាស្យូម ១.៥ ក្រាម (១ចុងស្លាបព្រាបាយ)/ដើម
៧ អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំ	
៨ អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំ	ដី កែង ២.៥ ក្រាម (១ចុងស្លាបព្រាបាយ)/ដើម
៩ អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំ	
១០ អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំ	
១១ អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំ	ដី កែង ២.៥ ក្រាម (១ចុងស្លាបព្រាបាយ)/ដើម
១២ អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំ	
១៣ អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំ	
១៤ អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំ	ដី កែង ២.៥ ក្រាម (១ចុងស្លាបព្រាបាយ)/គុម្ព
១៥ អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំ	
១៦ អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំ	
១៧ អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំ	បញ្ចប់ការប្រមូលផល



**៦. ការថែទាំ**

- កាត់មែកក្បែង រឺ ខ្លែងខ្លែកខាងក្រោមចេញ ដើម្បីកុំអោយផ្លែទាបជាប់នឹងដី
- ១០ថ្ងៃក្រោយដាំ ត្រូវដោតទំរ (កូនឈើ) ទប់កុំអោយដើមដួលនៅពេលមានផ្លែច្រើន
- ត្រូវកាត់ស្លឹកចាស់ៗផ្នែកខាងក្រោមចេញ ដើម្បីអោយពន្លឺ និងខ្យល់ចូលគ្រប់គ្រាន់



**ដើមត្រប់បានកាត់ខ្លែងផ្នែកខាងក្រោមចេញដើម្បី  
អោយខ្យល់ចេញចូលបានល្អ**





ដើមត្រប់បេះមិនបានរយៈពេលវែងដោយសារដើមត្រប់មិនបានកាត់ខ្លួនផ្នែកខាងក្រោមចេញ និងមិនបានដាត់ឡើង

**៧. ការប្រមូលផល**

- អាចប្រមូលផលបាន ពី ៥៥-៨០ថ្ងៃបន្ទាប់ពីដាំ គឺអាស្រ័យនឹងប្រភេទពូជ
- ត្រូវប្រើកាំបិត រឺ កន្ត្រៃដើម្បីកាត់ផ្លែមិនត្រូវប្រលេះផ្លែនឹងដៃទេ វាអាចធ្វើអោយបាក់មែកបាន ។

