

ព្រឹត្តិបត្របច្ចេកទេសលេខ ៨០

## វិធានការចម្រុះការពារដំណាំ - ដំណាំអន្ទាក់

### តើដំណាំអន្ទាក់គឺជាអ្វី?

ដំណាំអន្ទាក់ គឺជាប្រភេទដំណាំស្មៅដែលគេដាំ ព័ទ្ធជុំវិញដំណាំមួយ ដើម្បីខ្ចីណូវាអោយនៅដាច់ដោយ ឡែកពីបណ្តារុក្ខជាតិ ឬដំណាំមួយចំនួនទៀតដែលដុះនៅ ក្បែរគ្នា ដែលអាចជាប្រភពចម្លងនូវជម្ងឺវីរុស និងកត្តា ចង្រៃដីទៃទៀតមកលើដំណាំ។



គោលបំណងសំខាន់របស់ដំណាំអន្ទាក់ គឺដើម្បី ការពារការចម្លង ជម្ងឺវីរុស ចេញពីដំណាំមួយចំនួនតាម រយៈពេលពេល ហើយក៏មានករណីខ្លះ ចម្លងតាមរយៈពពួក មមាចជញ្ជក់ស្លឹកផងដែរ ។ នៅពេលដែលពពួកសត្វល្អិត

ទាំងនេះបានជញ្ជក់យករុក្ខសរសរបស់រុក្ខជាតិមានជម្ងឺ វាបាននាំយកមកជាមួយ នូវមេរោគជម្ងឺវីរុសដែលនៅជាប់ផ្នែកខាងក្រៅ មាត់របស់វា (ម្កូលប៊ីត) ហើយនៅពេលវាចុះទៅលើដំណាំស្លឹកធំមួយចំនួន វានឹងចម្លងមេរោគទៅអោយដំណាំនោះក្លាយ ដូច្នេះដំណាំអន្ទាក់ដើរតួនាទីជាដំណាំជួរមុខ ក្នុងការការពារដំណាំនៅពេលដែលសត្វល្អិតមកដល់ វាត្រូវតោងជាប់និងចុច ជញ្ជក់លើដំណាំអន្ទាក់មុនគេ ដែលជាហេតុធ្វើអោយមាត់របស់វាត្រូវបានលាងសម្អាតមុននឹងចូលទៅចុចជញ្ជក់ដំណាំដែល ការពារ ។ ពពួកដំណាំស្មៅមួយចំនួនដូចជា អំពៅ ស្មៅចំណីសត្វ ស្រូវមីឡេ ស្លួយ (ស្មៅចំណីសត្វមានគ្រាប់) និងពោត គឺ ជាប្រភេទដំណាំអន្ទាក់ដែលគេនិយមដាំដុះជាងគេ ដោយសារវាជាដំណាំដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ និងងាយស្រួលដាំដុះ ។

ដំណាំអន្ទាក់ មានតួនាទីបន្ថែមទៀត គឺជារុក្ខជាតិរបាំងជួយការពារដំណាំ ពីខ្យល់ខ្លាំង ធ្នូលី និងអាចជួយថែរក្សា សត្រូវធម្មជាតិ ដូចជា ពពួកសត្វអណ្តើកមាស និងសត្វកណ្តុបបុកស្រូវ ។

### តើដំណាំអន្ទាក់ត្រូវមានលក្ខណៈសំខាន់ៗអ្វីខ្លះ ដែលអាចជួយការពារដំណាំ កុំអោយឆ្លងជម្ងឺវីរុសបាន?

1. ដំណាំអន្ទាក់ត្រូវខ្ពស់ជាងដំណាំដែលយើងចង់ការពារ ដូច្នេះគេត្រូវដាំវាឱ្យបានមុនដំណាំ ។ ជាទូទៅដំណាំ អន្ទាក់ត្រូវដាំពី ៣ ទៅ ៤សប្តាហ៍ មុនដំណាំដែលចង់ ការពារ ។
2. ដើម្បីការពារក្រុមដំណាំ អំបូរត្រសក់ និង អំបូរសូឡា ណាសេ (ក្របំ ម្នេស ប៉េងប៉ោះ) កុំឱ្យឆ្លងជម្ងឺវីរុស គេត្រូវដាំដំណាំអន្ទាក់ដូចជា ពោត ស្លួយ អំពៅ ស្មៅ ដែលខ្ពស់ ឬ ពពួកឬស្សីទាប ដើម្បីការពារ ។





3. ត្រូវដាំដំណាំអន្ទាក់នៅជុំវិញចម្ការ ដើម្បីការពារកត្តាចង្រៃមិនឱ្យមានលទ្ធភាពចូលទៅដល់ចម្ការបាន ១០០% ។
4. ដំណាំអន្ទាក់ត្រូវក្រាស់ល្មម (យ៉ាងហោចឱ្យបាន ៣ជួរក្នុងករណីជាដំណាំពោត) ដើម្បីការពារភ្នាក់ងារចម្លងរោគពីការឆ្លងកាត់ដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ដំណាំ ។
5. ដើម្បីជៀសវាងពីការចម្លងរោគបណ្តាលមកពីជម្ងឺវីរុសមិនត្រូវអោយមានពពួកស្មៅស្លឹកធំនៅក្នុងដំណាំអន្ទាក់ដូចគ្នា ដែលជាហេតុបង្កឱ្យជម្ងឺវីរុសមានការសាយភាយ ។
6. ត្រូវដាក់ជីស្រោចស្រពដំណាំអន្ទាក់អោយបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីអោយមានពណ៌បៃតងស្រស់ ដែលអាចជួយទាក់ទាញពពួកចៃចូលមកទំ ។
7. ត្រូវថែរក្សាដំណាំអន្ទាក់កុំឱ្យមានកត្តាចង្រៃ និង ជម្ងឺដូចជា ពពួកជម្ងឺផ្សិត ចៃពោត កញ្ចែរពោត និងដង្កូវ ដើម្បីការពារកត្តាចង្រៃកើតឡើងវិញក្នុងដំណាំ ។

**កម្ពុជាហាវេស**  
 ផ្ទះលេខ ៤៦ ផ្លូវ ៣១០ សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន  
 ក្រុងភ្នំពេញ  
 ទូរស័ព្ទ ០២៣ ៩៩៦ ៤១៩  
 harvest@fintrac.com

ព្រឹត្តិបត្រនេះរៀបចំឡើងក្រោមការឧបត្ថម្ភពីប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ (USAID) ។

ខ្លឹមសារនៅក្នុងឯកសារនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្វីនត្រាក់ Fintrac Inc. និងមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់ USAID ឬរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយ ។